

**SCHEDA N° 200**

**ORDINE Agaricales**

<b>GENERE</b> <i>Agrocybe</i>	<b>SPECIE</b> <i>A. molesta</i>	<b>AUTORE</b> (Lasch) Singer	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 15/04/2016	<b>LUOGO DI RACC.</b> Parco cittadino	<b>COMUNE</b> Castelfranco Veneto	<b>PROV.</b> TV
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 48	<b>I.G.M.</b> II 104	<b>RACCOGLITORE</b> Franco Flavio Pinton	

**HABITAT:**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI     | <input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI          | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                              |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO                | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE  |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                    | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |   |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME             | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                                |
| <b>BOSCO DI:</b> MISTO DI LATI-AGHIFOGLIE PIANIZIALE |  | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO             | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO     | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE                           |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                    | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI  |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** Prato con varie piante di latifoglie

**NOTE:** Stazione di crescita gregaria, in gruppetti vicini, e a gambi anche fascicolati; in un prato fra l'erba, terreno molto umido.

**MICROSCOPIA:** Spore 11-13 x 6-8 µm. ellissoidali, lisce, bruno tabacco in massa.

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia Zanichelli pag. 274 al 742 Funghi d'Italia A.M.B. vol 1 a pag. 248

**DETERMINATORE** Franco Flavio Pinton

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



AGROCYBE MOLESTA



AGROCYBE MOLESTA



AGROCYBE MOLESTA



AGROCYBE MOLESTA



AGROCYBE MOLESTA



AGROCYBE MOLESTA

## DESCRIZIONE

Agrocybe molesta (Lasch) Singer

**Ordine:** Agaricales

**Famiglia:** Bolbitiaceae

**Genere:** Agrocybe

**Specie:** A. molesta

**Sezione:** Praecoces : (Konrad et Maubl.) Singer- Stipite con anello; crescita primaverile

**Sinonimi:** Agrocybe dura ( Bolton ) Singer 1936  
Pholioa dura Bres.1892  
Agaricus molestus Lasch 1828

**Capello:** 3-10 cm. di diametro, emisferico, poi convesso e infine appianato, con margine a lungo involuto e sempre con residui del velo, colorazione bianco sporco, crema-grigiastro molto pallido, poi ocra-beige. La cuticola liscia, un poco viscosa con il tempo umido, si formano delle screpolature con il tempo secco.

**Lamelle:** Fitte, adnate smarginate al gambo, intercalate da lamellule di colore nocciola chiaro nei giovani, poi bruno-violacee alla maturazione, il filo si presenta irregolare, cotonoso di colore canella-bruno.

**Carne:** Consistente nel capello, fibrosa nel gambo, bianco latte; odore leggero, farinoso, sapore vagamente di farina e amarognolo, talora quasi dolce.

**Gambo:** 4-10 x 0,5-1,5 cm. cilindrico, fibroso, fragile più o meno svasato all'apice, biancastro si sporca d'ocra nella parte inferiore. Si presenta un anello bianco, membranoso, fragile e fugace con frammenti appendicolati al margine del capello.

**Spore:** 10-14 × 6-8 μm ellitiche, lisce, a doppia parete, bruno-tabacco. basidi tetrasporici, cistidi imeniali piriformi.

**Habitat:** Dalla primavera all'autunno inoltrato, specialmente nei prati e nei giardini, parchi e campi incolti, in piccoli gruppi. Comune negli areali di crescita poco reperibile altrove. note: Gregaria, scambiabile con *Agrocybe praecox*, quest'ultima però è meno carnosa, più molle e odora di farina.

Autore della scheda: Cerantola Bruno.

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton - Dino Giuseppe Cerantola.