

SCHEDA N° 0158

ORDINE Agaricales

GENERE Amanita	SPECIE A. caesarea	AUTORE (Scop.) Pers.	
DATA DI RACCOLTA 29/08/2015	LUOGO DI RACC. Parco locale	COMUNE Castelfranco Veneto	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO LATIFOGLE QUERCUS		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Quercie, Ontani, Pioppi.

NOTE: stazione di crescita di pochi esemplari viciniori, in luogo assolato e siccitoso ma dopo una cospicua pioggia

MICROSCOPIA: Le spore sono ovoidali, lisce, ialine, 9-12 x 6-7 µm, bianche volgenti al giallognolo, non amiloidi.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia A.M.B Vol. 1 - pag. 123 - Funghi d'Italia Zanichelli pag. 26 al 14

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



OVULO AMANITA CAESAREA



AMANITA CAESAREA




AMANITA CAESAREA



AMANITA CAESAREA



AMANITA CAESAREA



AMANITA CAESAREA

DESCRIZIONE

Amanita caesarea

Ordine: Agaricales
Famiglia: Amanitaceae
Genere: Amanita
Specie: A. caesarea
Sezione: Caesareae Singer

Cappello: 5-20 cm. da emisferico a convesso, poi ovoidale-appianato. Cuticola facilmente separabile, liscia, brillante, colore rosso arancio uniforme. L'orlo del cappello è costantemente striato.

Lamelle: Molto fitte, intervallate da lamellule più corte, piuttosto larghe, libere al gambo e di colore giallo-uovo o giallo-dorato.

Carne: Compatta, soda, spessa di colore bianco, gialla ai margini; assume tonalità giallognole più o meno cariche sotto la Cuticola del cappello e nella zona perimetrale del gambo sezionato. È di odore e sapore molto gradevoli.

Gambo: Cilindrico, e di colore giallo, alto 9-15 cm. la base del gambo presenta un leggero rigonfiamento ed è avvolto dal residuo del velo generale bianco.
Anello ampio, membranoso ricadente a mo' di festone, di colore perfettamente giallo e percorso da evidenti e caratteristiche striature longitudinali.

Volva: a sacco, attenuata alla base, persistente, liscia, carnosa e libera al gambo. Di consistenza membranosa, ampia e spessa, a bordo libero; di colore bianco e bianco-giallognolo all'interno.

Spore: Sono ovoidali, lisce, ialine, $9-12 \times 6-7 \mu\text{m}$, bianche volgenti al giallognolo, non amiloidi.

Habitat: In zone temperate, ma calde e secche sotto le latifoglie. Quercia, Castagno, Nocciolo. non rara anche se non ovunque diffusa.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola