

SCHEDA N° 0295

ORDINE Amanitales

GENERE Amanita	SPECIE A. citrina f.alba	AUTORE (Pers.) Qué. & Bataille	
DATA DI RACCOLTA 18-10- 2015	LUOGO DI RACC. colline di Possagno	COMUNE Possagno	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 450	I.G.M. III 083	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : MISTO DI AGHI-LATIFOGLIE		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : bosco montano misto Castagno Carpino Abete e altre latifoglie

NOTE : Stazione di crescita gregaria in pochi esemplari sotto Castagni e qualche Abete in mezzo all'erba

MICROSCOPIA: Spore da largamente ellissoidali a subsferiche, lisce, 8,6-10,6 x 7,4-9,9 um; amiloidi.

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia Zanichelli pag.38 al n°48 funghi d'Italia A.M.B. vol. 1 pag. 130 rigo 5

DETERMINATORE Franco Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



AMANITA CITRINA F. ALBA



AMANITA CITRINA F. ALBA



AMANITA CITRINA F. ALBA



A CITRINA V. ALBA PARTICOLARE ANELLO
MEMBRANACEO AMPIO



VOLVA CIRCONCISA SUBMEMBRANACEA



PARTICOLARE CAPPELLO EMISFERICO

DESCRIZIONE

Amanita citrina f. alba

Ordine: Amanitales
Famiglia: Amanitaceae
Genere: Amanita
Specie: A. citrina f. alba

Sezione: >> Validae Fr. - Velo generale friabile, ridotto sul pileo in placche farinose, volva oblitterata o circonscisa.

Sinonimi: Amanita bulbosa var. alba Pers., Traité champ. Comest. (Paris): 179 (1818)
Amanita mappa var. alba (Gillet) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 100 (1922)
Amanita venenosa var. alba Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 44 (1874) [1878]

Cappello: da 40-100 (140) mm, emisferico, quindi convesso, alla fine appianato-disteso, liscio, vischioso a tempo umido, sovente ricoperto da placche irregolari, resti del velo generale, di consistenza farinosa, biancastri ; margine privo di striature; biancastro, bianco latte uniforme.

Lamelle: libere, fitte, ventricose, con lamellule; di colore bianco latte, poi crema pallido.

Carne: consistente e compatta nel cappello, fibrosa nel gambo; bianco latte. Odore di rapa, sapore dolciastro, non gradevole.

Gambo: da 80-120 (150) X 8-18 (22) mm; cilindraceo, attenuato all'apice, diritto, con superficie fibrillosa; da bianco a bianco sporco, dapprima duro poi fistoloso o cavo. Alla base, che si allarga in un ampio bulbo subsferico e marginato, è presente una VOLVA submembranacea, circonscisa, bianca.

Spore: da largamente ellissoidali a subsferiche, lisce, 8,6-10,6 x 7,4-9,9 um; amiloidi.

Habitat: specie estivo-autunnale; cresce prevalentemente su terreno sabbioso sotto aghifoglie e latifoglie poco frequente.

Autore della scheda: Franco Flavio Pinton

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton