

**SCHEDA N° 0009**

**ORDINE Agaricales**

<b>GENERE</b> Amanita	<b>SPECIE</b> A. lactea	<b>AUTORE</b> Malencon, Romagn. et D.A. Reid	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 29-06-2010	<b>LUOGO DI RACC.</b> pian di coltura	<b>COMUNE</b> Lentiai	<b>PROV.</b> BL
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 750	<b>I.G.M.</b> III 063	<b>RACCOGLITORE</b> Pinton Franco Flavio	

**HABITAT:**

<input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI:</b> LATIFOLIE-AGHIFOLGIE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** aceri, carpini, castagni

**NOTE:** esemplari raccolti in periodo siccitoso dopo abbondanti piogge in stazioni di crescita con più carpofori e molto interrati

**MICROSCOPIA:** spore non amiloidi globulose ellissoidali 11-15x7,5-10 um

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'italia Zanichelli pag.32 al n°31 R. Courtequisse pag. 276 al n°836

**DETERMINATORE** Pinton Franco Flavio

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



AMANITA LACTEA\_1



AMANITA LACTEA\_2



AMANITA LACTEA PARTICOLARI VOLVA



AMANITA LACTEA\_4



AMANITA LACTEA\_5

## DESCRIZIONE

AMANITA LACTEA: Malencon, Romagn. et D.A. Reid

Tassonomia:

Classe: Basidiomycetes

Ordine: Agaricales

Famiglia: Amanitaceae

Genere: Amanita

Specie: A.lactea

Sezione Amanitopsis (Roze) Konrad et Maubl..\_ Stipite non bulboso, con anello oblitterato, subito evanescente, velo generale da membranoso a submembranoso con o senza u.a.f.

Cappello: cuticola lucente bianca, con resto di velo generale doppio e spesso giallastro, margine del cappello striato.

Lamelle: bianche fragili poche lamellule.

Gambo: all'apice fioccoso bianco, all'interno bambagioso.

Volva: membranosa, sacciforme inguainante spessa bianca poi bruno ocracea

Carne: bianca

Spore: non amiloidi globulose ellissoidali

Carattere determinante: la presenza di una decorazione evidente sul gambo, estesa sino alla volva (doppia e persistente con pochi sferociti) stessa forforosità si nota sul filo delle lamelle sugli esemplari appena raccolti.

Habitat: estate-autunno, spesso in ambiente mediterraneo, sotto varie essenze arboree rara

Carpofori spesso da me reperiti anche in presenza di Carpinus, in periodi siccitosi, dopo abbondanti piogge.

FOTO DI FRANCO FLAVIO PINTON.