

SCHEDA N° 0198

ORDINE Agaricales

GENERE Amanita pantherina	SPECIE A. pantherina	AUTORE (DC.) Krombh.	
DATA DI RACCOLTA 30/06/2017	LUOGO DI RACC. Colli di Possagno	COMUNE Possagno	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 650	I.G.M. II 083	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO AGHI-LATIFOGLIE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI MISTO LATIFOGLIE AGHIFOGLIE

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Misto latifolia e aghifolia

NOTE: specie frequente in singoli esemplari o più esemplari molto vicini in luoghi umidi, fine estate primo autunno

MICROSCOPIA: Spore bianche in massa, ellissoidali, non amiloidi, 9,5-11,5 × 6,5-7,5 µm.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag. 24 al 11 - Funghi d'Italia vol 1 A.M.B a pag. 126

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



AMANITA PANTHERINA



AMANITA PANTHERINA



AMANITA PANTHERINA



AMANITA PANTHERINA

DESCRIZIONE

Amanita pantherina

Ordine: Agaricales

Famiglia: Amanitaceae

Genere: Amanita

Specie: A. pantherina

Sezione: Amanita Corner et Bas - stipite bulboso con anello ± persistente velo generale friabile

Sinonimi:

Cappello: 5-10 cm; da emisferico a convesso poi pianeggiante, con margine nettamente striato; bruno-castano, marrone ± carico. Cuticola liscia, di colore bruno -marrone-rossastro, cosparsa da sottili verruche candide immutabili.

Lamelle: bianche, libere al gambo, fitte, un poco ventricose, intercalate con lamellule.

Carne: bianca, soda nel cappello, più fibrosa nel gambo. Di odore quasi nullo o appena terroso; sapore dolce a maturità sgradevole, di odore cattivo.

Gambo: 8-12 x 1-2 cm; cilindrico, assottigliato verso l'alto; si ingrossa alla base in un bulbo.

Anello: bianco e striato nella parte superiore, membranoso, orlo liscio o fioccoso, piuttosto basso.

Volva: aderente al bulbo e dissociata in anelli, bianca, nettamente circonscisa, spesso sormontata da uno o più cercini fioccosi ± completi e obliqui.

Spore: bianche in massa, ellissoidali, non amiloidi, $9,5-11,5 \times 6,5-7,5 \mu\text{m}$.

Habitat: fungo ubiquitario in boschi di aghifoglie e latifoglie, sovente al margine dei boschi; molto comune.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola