

**SCHEDA N° 0061**

**ORDINE Cantharellales**

<b>GENERE</b> Cantharellus	<b>SPECIE</b> C. cinereus	<b>AUTORE</b> (Pers.) Fr.	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 28-09-12	<b>LUOGO DI RACC.</b> Colli di Possagno	<b>COMUNE</b> Possagno	<b>PROV.</b> TV
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 400	<b>I.G.M.</b> II 083	<b>RACCOGLITORE</b> Dino Giuseppe Cerantola	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI:</b> CASTAGNO		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** Castagno, Betulla, Carpino.

**NOTE:** Su terreno nudo.

**MICROSCOPIA:** Spore: da ovoidali a ellissoidali, lisce.

**BIBLIOGRAFIA:** AMB Vol. 1 - pag. 431 - Zanichelli pag. 524 al 1464

**DETERMINATORE** Dino Giuseppe Cerantola

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



CANTHARELLUS CINEREUS



CANTHARELLUS CINEREUS\_1



CANTHARELLUS CINEREUS\_2



SPORATA BIANCA

## DESCRIZIONE

*Cantharellus cinereus*

Classe: Basidiomycetes  
Ordine: Cantharellales  
Famiglia: Cantharellaceae  
Genere: *Cantharellus*  
Specie: *C. cinereus*

Cappello: appena convesso da giovane con il margine che in seguito si distende, pruinoso, ondulato-lobato; la superficie pileica è pruinoso-squamosa, soprattutto verso il bordo, di colore grigiastro e con tonalità più o meno brune; questi toni dipendono dall'età e dalle condizioni ambientali essendo più chiari con tempo secco e più nerastri se umido.

Imenoforo: è formato da venature e pliche, molto evidenti a pieno sviluppo, anastomizzate, spaziate e ramificate; il colore di queste pseudolamelle è grigio-avana con tonalità anche bluastre.

Carne: bianco-grigiastra, con odore di prugna.

Gambo: vuoto, fibroso, grigiastro.

Spore: da ovoidali a ellissoidali, lisce.

Habitat: Cresce isolato in boschi caldi di latifoglie non comune.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola