

SCHEDA N° 0203

ORDINE Agaricales

GENERE Cortinarius	SPECIE C. speciosissimus	AUTORE Kühner & Romagn.	
DATA DI RACCOLTA 18/07/2017	LUOGO DI RACC. Frassènè	COMUNE Gosaldo	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1200 mt.	I.G.M. II 045	RACCOGLITORE Cds Gmc	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: AGHIFOGLIA - LATIFOGLIA

- | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> RADO | <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Abete rosso

NOTE: Carpofori singoli e/o a gruppetti vicini, tra il muschio e i mirtilli, non comune.

MICROSCOPIA: spore 9,5-11 x 7,2-8,4 µm, da ovoidali a ellissoidali, verrucose, ocracee.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli a pag.344 al 936. Funghi d'Italia A.M.B vol.1 a pag 181.

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CORTINARIUS SPECIOSISSIMUS 1



CORTINARIUS SPECIOSISSIMUS 2



CORTINARIUS SPECIOSISSIMUS 3



CORTINARIUS SPECIOSISSIMUS 4



DESCRIZIONE

Cortinarius speciosissimus

Ordine: Agaricales

Famiglia: Cortinariaceae

Genere: *Cortinarius*

Specie: *Speciosissimus*

Sezione: Orellani: basidiomi robusti bruno-arancioni, bruno rossastri, odore rafanoide

Cappello: 3-8 cm, inizialmente conico o conico-campanulato, poi convesso, infine disteso, talvolta con un evidente umbone acuto, la cuticola asciutta, opaca, di colore bruno rossiccio aranciato, radialmente fibrillosa o ricoperta da minutissime squamature. Margine talvolta giallastro sugli esemplari giovani, per resti di velo.

Lamelle: smarginato-uncinate, piuttosto spaziate, panciute, prima concolori alla cuticola poi bruno-ruggine / cannella.

Carne: soda, da giallo zafferano a bruno rossastro, specialmente verso la base del gambo, con odore leggero, rafanoide e sapore dolciastro.

Gambo: 8-14 × 1-2 cm, slanciato, cilindrico, più o meno arcuato, talvolta clavato o fusiforme, pieno, poi farcito, inizialmente ocrea poi bruno rossastro, decorato da resti di velo giallo chiaro che formano delle bande anulari con tipico disegno a zig-zag.

Spore: 9,5-11 × 7,2-8,4 µm, da ovoidali a elissoidali, verrucose, ocracee.
basidi: 32x20 µm piriformi, tetrasporici.

Habitat: gregario in gruppi più o meno numerosi, talora subcespitoso, nelle peccete umide, nelle zone muschiose, tra i mirtilli e soprattutto in prossimità di detriti legnosi o ceppi marcescenti; estate-autunno, non comune.

Autore della scheda: Pellizzari R.

Autore delle foto: Cerantola Dino G.