

**SCHEDA N° 0299**

**ORDINE Boletales**

<b>GENERE</b> <i>Hemileccinum</i>	<b>SPECIE</b> <i>H. depilatum</i>	<b>AUTORE</b> (Redeuilh) Šutara	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 03/09/2021	<b>LUOGO DI RACC.</b> Cà Marcello Levada	<b>COMUNE</b> Piombino Dese	<b>PROV.</b> PD
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 25	<b>I.G.M.</b> IV 127	<b>RACCOGLITORE</b> Dino G. Cerantola - Bruno Cerantola	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI:</b> PLANIZIALE DI VARIE LATIFOGLIE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** bosco di varie latifoglie soprattutto di Carpino.

**NOTE:** Singolo e un unico esemplare su un'aiuola in prossimità di Carpini

**MICROSCOPIA:** spore ellissoidali-fusiformi, 10,5-13,0 x 4,5-5,2 um,

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia pag. 494 al 1386 - Funghi d'Italia AMB vol.2 pag. 894 - Funghi in Italia Nicolò Oppicelli pag. 156

**DETERMINATORE** Dino G. Cerantola- Flavio Pintor

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**HEMILECCINUM DEPILATUM**



**HEMILECCINUM DEPILATUM**



**HEMILECCINUM DEPILATUM**



**HEMILECCINUM DEPILATUM**



**HEMILECCINUM DEPILATUM**

## DESCRIZIONE

### **Hemileccinum depilatum**

**Ordine:** Boletales  
**Famiglia:** Boletaceae  
**Genere:** Hemileccinum  
**Specie:** H. depilatum

**Sezione:** >> Pseudoboleti Singer - Basidiomi con aspetto simile ai Boletus; pileo glabro + - vellutato; carne, tubuli e pori immutabili o azzurrognoli al tocco o al taglio; stipite con o senza reticolo.

**Sinonimi:** Boletus depilatus Redeuilh , Bull. trimestre. Soc. micol. FR. 101 (4): 389 (1986) [1985]  
Leccinum depilatum (Redeuilh) Šutara , Česká Mykol. 43 (1): 4 (1989)  
Xerocomus depilatus (Redeuilh) Manfr. Binder & Besl , Micologia 2000 (Trento): 85 (2000)

**Capello:** 5 - 13 cm. carnoso, da emisferico a convesso, poi pulvinato; margine un poco eccedente nel giovane, con cuticola asciutta, liscia, vellutata, presenta piccole fossette e gibbosità, non asportabile di colore bruno - nocciola o bruno - castagno.

**Tuboli:** lunghi e sottili, liberi al gambo da giallo - limone a giallo - verdastro che non virano alla pressione.

**Carne:** soda, a maturazione rammollisce, biancastra o gialla in prossimità della corteccia del gambo e sopra i tuboli, appena brunastra sotto la cuticola, immutabile al taglio.

**Gambo:** 5-12 x 1-2,5 cm, cilindrico, spesso flessuoso e incurvato, duro, che termina con una lunga base profondamente radicante, di colore giallo - giallastro, talora con deboli colorazione rossastre nella parte superiore, privo di reticolo ma ricoperto da una fine punteggiatura forfacea alla pressione.

**Spore:** 10,5-13,0 x 4,5-5,2 um, ellittiche fusiformi, olivacee , brunastre in massa, epicute a struttura imeniforme. con depressione sopra-apicolare, a parete moderamente spessa, ife terminali rigonfie.

**Habitat:** in estate e primo autunno su boschi di latifoglie su terreno calcareo, spesso legato al carpino.

Autore della scheda: Bruno Cerantola Cds gmc

Autore delle foto: Dino G. Cerantola