

SCHEDA N° 0196

ORDINE Russulales

GENERE Heterobasidion	SPECIE H. annosum	AUTORE (Fr.) Bref.	
DATA DI RACCOLTA 03/03/2017	LUOGO DI RACC. Val di Sella	COMUNE Borgo Valsugana	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200	I.G.M. III 061	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

- | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: MISTO CONIFERE E LATIFOLIA | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO | DI ABIES ALBA |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Conifere e Latifolia

NOTE: diversi esemplari maturi su tronco caduto di Abies alba

MICROSCOPIA: spore subglobose, finemente verrucose; 5-6 x 3,5-4,5 µm.

BIBLIOGRAFIA: A.M.B Vol. 3 - pag. 1414 - Zanichelli pag. 564 al 1593 - Funghi europei Poliporaceae pag. 261

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



HETEROBASIDION ANNOSUM



HETEROBASIDION ANNOSUM



HETEROBASIDION ANNOSUM



HETEROBASIDION ANNOSUM

DESCRIZIONE

Heterobasidion annosum

Ordine: Russulales
Famiglia: Bondarzewiaceae
Genere: Heterobasidion
Specie: H. annosum
Sezione:

Sinonimi: Fomes annosus (Fr.) Cooke
Fomitopsis annosa (Fr.) P. Karst.
Polyporus annosus Fr.

Basidioma: 10-20 cm; di forma variabile, isolato o imbricato, spesso resupinato o anche espanso-reflesso o a mensola semicircolare; superficie rugosa, irregolarmente nodosa, pianeggiante, rivestita da una crosta lucida, bruna, poi nerastra con il margine a lungo biancastro spesso ondulato.

Imenoforo: formato da tubuli e pori, tubuli pluristratificati e pori piccoli, rotondi o leggermente angolosi, bianchi, imbrunenti a maturità. La superficie poroide imbrunisce lievemente alla pressione nei carpofori freschi.

Carne: poco spessa, elastica da giovane, poi dura e legnosa, con colore ai tubuli o appena più chiara, con odore un po' sgradevole, acidula o come di muffa.

Spore: subglobose, finemente verrucose; 5-6 x 3,5-4,5 µm.

Habitat: Fungo lignicolo, parassita e poi saprofito principalmente su legno di conifere fra cui *Abies alba*; agente di carie bianca.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola