

SCHEDA N° 0027

ORDINE RUSSULALES

GENERE LACTARIUS	SPECIE L. CIRCELLATUS	AUTORE (Battara) Fr.
DATA DI RACCOLTA 19-05-2010	LUOGO DI RACC. PARCO BOLASCO	COMUNE CASTELFRANCO V. PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 44	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE FACCHIN GIUSEPPE

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: CARPINO | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : TIGLIO-QUERCUS-CEDRO

NOTE : Periodi di crescita 19, 26 maggio, 22, 29 settembre.

MICROSCOPIA: Spore da 8 X 7µm.

BIBLIOGRAFIA : Zanichelli funghi d'italia pag. 402 al 1116 - A.M.B. funghi d'italia vol. 2 pag. 853

DETERMINATORE FACCHIN GIUSEPPE

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



LACTARIUS CIRCELLATUS_1



LACTARIUS CIRCELLATUS_2



LACTARIUS CIRCELLATUS_3



LACTARIUS CIRCELLATUS_4



LACTARIUS CIRCELLATUS_5



LACTARIUS CIRCELLATUS_6

DESCRIZIONE

Cappello: 3-8 cm, inizialmente convesso, presto piano-convesso con centro depresso e margine involuto; cuticola viscida se umida, opaca, di colore bruno grigiastro, bruno fulvastro, grigio scuro, caratteristicamente zonata da cerchi concentrici.

Lamelle: da adnate a subdecorrenti sul gambo, fitte, biancastre, poi ocre, filo intero.

Gambo: 3-6 x 0,8-2 cm, cilindrico, attenuato alla base, longitudinalmente rugoso, picchiettato, da biancastro a beige carnicino, pruinoso verso l'apice.

Carne: biancastra, grigiastro sotto la cuticola, cassante, secernente un lattice bianco immutabile e acre alla frattura, con odore leggero subnullo, sapore acre.

Autore della scheda - FACCHIN GIUSEPPE

Autore delle foto - Pinton Franco Flavio