

SCHEDA N° 0064

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Leucopaxillus</i>	SPECIE <i>L. giganteus</i>	AUTORE (Sowerby) Singer	
DATA DI RACCOLTA 26/06/12	LUOGO DI RACC. Forcella Aurine	COMUNE Gosaldo	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1300	I.G.M. II 045	RACCOLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI :

- | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> RADO | <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Margine del bosco su prato.

NOTE : Margine del bosco esemplare molto grande diametro cm. 49.

MICROSCOPIA: Spore: 6,5 / 7,5 x 3,5 / 4,5 µm. di forma ellittica, amiloide, sporata bianca.

BIBLIOGRAFIA : AMB Vol. 1 - pag. 77 - Zanichelli pag. 176 al 448

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



LEUCOPAXILLUS GIGANTEUS



LEUCOPAXILLUS GIGANTEUS_1



LEUCOPAXILLUS GIGANTEUS_2



LEUCOPAXILLUS GIGANTEUS_3



SPORATA BIANCA



DESCRIZIONE

Leucopaxillus giganteus

Ordine: Agaricales
Famiglia: Tricholomataceae
Genere: *Leucopaxillus*
Sottogenere: *Aspropaxillus*
Specie: *L. giganteus*

Cappello: fino a 49 cm di diametro, inizialmente convesso, presto depresso al centro. La cuticola è secca, bianco-crema chiaro, poi appianato, infine centralmente depresso ed un po' imbutiforme in vecchiaia, margine carnoso, involuto nel giovane, costolato; superficie liscia, da inizialmente biancastra ad avorio-ocrea con la maturazione.

Lamelle: piuttosto fitte, strette, decorrenti, o anastomizzate verso il gambo, biancastre, infine con riflessi ocrei, f orcate in prossimità dell'orlo, facilmente separabili dalla carne del cappello, nettamente decorrenti.

Gambo: tozzo, corto, un po' pruinoso, con superficie biancastra, opaca, con colore al cappello, imbrunente alla manipolazione.

Carne: molto compatta, fibrosa, biancastra e liscia consistente ed elastica, con odore farinoso-erbaceo sgradevole e sapore analogo.

Spore: 6,5 / 7,5 x 3,5 / 4,5 µm. di forma ellittica, amiloide, sporata bianca.

Habitat: autunno, in gruppi ± numerosi in prati e radure

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola