

**SCHEDA N°** 0036

**ORDINE** Agaricales

<b>GENERE</b> Pseudoclitocybe	<b>SPECIE</b> P. cyathiformis	<b>AUTORE</b> (Bull. : Fr.) Singer	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 08-10-10	<b>LUOGO DI RACC.</b> Vallà	<b>COMUNE</b> Riese Pio x°	<b>PROV.</b> TV
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 48	<b>I.G.M.</b> I 104	<b>RACCOGLITORE</b> CERANTOLA GIUSEPPE	

**HABITAT:**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO            | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO           | <input type="checkbox"/> ARENILE           |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A        |  |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME         | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO             | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO   |

**BOSCO DI:**

- |  |   |                                |                                |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> RADO  | <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO        | <input type="checkbox"/> VIVO                 | <input type="checkbox"/> MORTO | DI                             |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA       OMBROSA       MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO     MOLTO UMIDO     UMIDO     ASCIUTTO     SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :**

**NOTE :**

**MICROSCOPIA:**

**BIBLIOGRAFIA :** A.M.B. Funghi d'Italia vol.1 pag. 46 - Cetto vol. 1 pag. 150 - Funghi D'italia Zanichelli pag.160 al 393

**DETERMINATORE** CERANTOLA GIUSEPPE

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**     FRESCHI     SECCHI



CAPOFORO



CARPOFORO\_1



IMENIO



LAMELLE



SPORATA BIANCA

## **DESCRIZIONE**

Cappello notevolmente ombellicato-subinfundibuliforme con zona discale a volte munita da prominente papilla, le colorazioni grigio-fuliginose.

Lamelle a tratti forcate-intervenose, fitte, non libere al gambo, separabile, talvolta venate alla base.

Gambo grigio-cinero-nolo striato da fibrille chiare su fondo poco più chiaro del cappello.

Entita' molto comune, praticamente ubiquitaria.

Odore cianico, simile a quello di Clitocybe gibba

Autore della scheda - CERANTOLA GIUSEPPE DINO