

SCHEDA N° 0329

ORDINE Russulales

GENERE Russula	SPECIE R. Sardonica	AUTORE Fr. 1838	
DATA DI RACCOLTA 12/12/2021	LUOGO DI RACC. Brussa	COMUNE Caorle	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 5	I.G.M. I. 129	RACCOGLITORE Mark Mowlazadeh	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: LATIFOGIE MISTE E PINETE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: misto di latifoglie, aghifoglie e altri piccoli arbusti.

NOTE: Stazione di crescita gregaria, solitaria e a gruppi, in pinete marittime

MICROSCOPIA: Spore: 7-9 x 6,5-7,5 micron, ovoidali, verrucose, crestato-connesse e reticolate

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag. 448 al 1257 - Funghi d'Italia AMB vol 2 pag. 826

DETERMINATORE Cds. Gmc. Castellano

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



RUSSULA SARDONIA



RUSSULA SARDONIA



RUSSULA SARDONIA



RUSSULA SARDONIA



RUSSULA SARDONIA

DESCRIZIONE

Russula Sardonìa

Ordine: Russulales

Famiglia: Russulaceae

Genere: Russula

Specie: R. Sardonìa

Sezione: Sottosezione Sardoninae Singer - Sporata da bianca (R. luteotacta) a crema, oca, carne dura, rigida; stipite spesso sfumato di rosa - rosso o violetto.

Sinonimi: Russula queletii p . , in Quélet, Mém. soc. Émul. Montbéliard , Ser. 2 5 : 185 (1872)
Russula flavovirens E. Bommer & M. Rousseau , Bull. soc. R.Bot. Belgio. 23 (n. 1): 310 (1884)
Russula drimeia Cooke 1881

Cappello: 4-8 cm, da convesso e leggermente umbonato a depresso in vecchiaia, con la superficie viscosa un po' brillante, di colore violetto o rosso vinoso scuro, con il centro nerastro, con zonature che posseggono riflessi olivastri.

Lamelle: subdecorrenti, mediamente fitte, strette, fragili e lacrimanti, color avorio citrino fin dall'inizio, poi crema ocraceo a maturazione.

Carne: compatta, sfumata di rosso sotto la cuticola, con odore fruttato debole e sapore molto acre.

Gambo: 3-6 x 1,2-4 cm; cilindrico, tozzo, quasi panciuto, robusto, pieno, di colore dal rosa rosso al violetto, con colore al cappello, più chiaro verso la base.

Spore: 7-9 x 6,5-7,5 micron, ovoidali, verrucose, cretato-connesse e reticolate. Sporata da crema a oca chiaro.

Habitat: In tarda estate-autunno fino ai primi freddi invernali tipica delle pinete in terreno sabbioso-siliceo, abbastanza comune.

Autore della scheda: Bruno Cerantola Cds Gmc

Autore delle foto: Dino G. Cerantola