

SCHEDE N° 0260

ORDINE Russulales

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| GENERE Scutigera | SPECIE S. pes-caprae | AUTORE (Pers.) Bondartsev & Singer | |
| DATA DI RACCOLTA 20/09/2020 | LUOGO DI RACC. Pian Bedole | COMUNE Varena | PROV. TN |
| ALTITUDINE S.L.M. 1400 mt. | I.G.M. IV 044 | RACCOGLITORE Pellizzari Renato | |

HABITAT:

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: AGHIFOGLIA | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Pinus sylvestris e Picea abies.

NOTE: stazione di crescita di alcuni esemplari su detriti legnosi in mezzo all' Erica sotto Pinus.

MICROSCOPIA: spore 7,5-10,5 x 5-6 µm, ellissoidali, bianche, lisce, ialine, monoguttulate, provviste d'apicolo, non amiloidi.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli a pag.570 al 1615; Funghi d'Italia AMB vol.1 a pag.395

DETERMINATORE Pellizzari Renato

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



SCUTIGER PES-CAPRAE



SCUTIGER PES-CAPRAE-CUTICOLA



SCUTIGER PES-CAPRAE IMENIO

DESCRIZIONE

Scutigiger pes-caprae

Ordine: Russulales
Famiglia: Albatrellaceae
Genere: Scutigiger
Specie: S. pes-caprae
Sezione:

Sinonimi: Albatrellopsis pes-caprae (Pers.) Teixeira
Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar
Boletus pes-caprae (Pers.) Cordier

Capello: largo 5-12 cm, carnoso, con forma convesso-circolare, di spatola o ventaglio (o un'orma di capra), irregolare, con margine ondulato; la cuticola è vellutata e ricoperta da squame colore bruno scuro, bruno-rossiccio.

Imenoforo: formato da tubuli e pori. I tubuli decorrono anche lungo il gambo, sono lunghi fino a 5 mm, di colore bianco, poi giallastro. Pori fino a 0,5-1 mm, bianchi, tendenti al giallo con l'invecchiamento, angolosi e poligonali, con contorno spesso lacerato, si macchiano di giallo al tocco.

Carne: compatta, soda, da bianca a giallina, con odore gradevole fungino; ha sapore grato che ricorda vagamente la nocciola.

Gambo: corto, quasi sempre molto eccentrico, grosso, ha forma cilindrica o leggermente clavata, la sua colorazione va dal biancastro in alto, bruno-giallastro in basso, scurisce alla manipolazione.

Spore: 7,5-10,5 x 5-6 µm, ellissoidali, bianche, lisce, ialine, monoguttulate, provviste d'apicolo, non amiloidi.
I basidi sono di 20-40 x 7,5-12 µm, claviformi, tetrasporici, presenza di giunti a fibbia basali, cistidi assenti.

Habitat: saprofita su detriti legnosi, in boschi di faggio (più frequente), altre latifoglie o abete. Cresce solitamente dalla tarda estate all'autunno inoltrato in condizioni di elevata umidità del substrato e atmosferica.

Autore della scheda: Pellizzari Renato

Autore delle foto: Pellizzari Renato