

SCHEDA N° 0219

ORDINE Polyporales

GENERE Trametes	SPECIE T. pubescens	AUTORE (Schumach.) Pilát	
DATA DI RACCOLTA 13/02/2018	LUOGO DI RACC. Vallà	COMUNE Riese Pio X°	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 54	I.G.M. I 104	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO	<input checked="" type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO	DI QUERCUS

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : siepe con varie specie di latifoglie

NOTE : Crescita su punta di ramo marcescente di Quercus tagliato 4 anni fa, agente di carie bianca

MICROSCOPIA: spore cilindriche a forma di salsiccia, lisce, non guttulate, biancastre in massa 5-6 x 1.5-2.5 µm.

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia vol 3 A.M.B a pag. 1422 - Funghi Europei Poliporaceae s.l. Annarosa Bernicchia pag. 535
 Funghi d'Italia Zanichelli pag. 562 al n. 1582

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



TRAMETES PUBESCENS



TRAMETES PUBESCENS



TRAMETES PUBESCENS



TRAMETES PUBESCENS



TRAMETES PUBESCENS

DESCRIZIONE

Trametes pubescens

Ordine: Polyporales
Famiglia: Polyporaceae
Genere: Trametes pubescens
Specie: T. pubescens
Sezione:

Sinonimi: Bjerkandera pubescens (Schumach.) P. Karst.
Coriolus pubescens (Schumach.) Quéf.
Polyporus pubescens (Schumach.) Fr.

Basidiomi: sessili o con il margine superiore ripiegato, singoli o imbricati.

Cappello: fino a 6 cm, a forma di conchiglia o a forma di rene, la superficie è tomentosa, vellutata a finemente vellutata, con zonature brunastre, con presenza di corti peli ispidi dal bianco al crema al bruno giallognolo.
Orlo a volte sinuoso, intero e peloso.

Imenoforo: formato da tuboli e pori. I pori 3-5 mm, di colore biancastro crema sono rotondeggianti, angolosi, con andamento a tratti labirintiforme. I tubuli 1-3 mm.

Carne: inconsistente, dura, suberosa, biancastra . Odore e Sapore insignificanti.

Spore: cilindriche a forma di salsiccia, lisce, non guttulate biancastre in massa 5-6 x 1.5-2.5 µm.

Habitat: tronchi di latifoglie marcescente, è agente di carie bianca. Rinvenuto su Quercus.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola