

SCHEDA N° 0048

ORDINE BOLETALES

GENERE XEROCOMUS	SPECIE X. RUBELLUS = B. versicolor Rostk.	AUTORE QUELET
DATA DI RACCOLTA 30-06-2010	LUOGO DI RACC. PARCO BOLASCO	COMUNE CASTELFRANCO V. PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 44	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE MILANI FELICE

HABITAT:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> RADO |
| <input type="checkbox"/> BOSCO DI: MISTO LATI-AGHIFOGLIA | | <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO |

PARCO CITTADINO

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : carpino, quercus, cedro

NOTE : Periodi di ritrovamento 30 giugno, 3 agosto, 5 ottobre

MICROSCOPIA: Spore da 10-13 x 4,5-5,5 µm.

BIBLIOGRAFIA : Zanichelli funghi d'italia pag. 498 al 1395 - A.M.B. funghi d'italia vol. 1 pag. 366 - B. Cetto vol.1 al 291

DETERMINATORE **MILANI FELICE**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



XEROCOMUS RUBELLUS_



XEROCOMUS RUBELLUS_2



XEROCOMUS RUBELLUS_3



XEROCOMUS RUBELLUS_4



XEROCOMUS RUBELLUS_5



XEROCOMUS RUBELLUS_6

DESCRIZIONE

Cappello, 5 ± 10 cm, è poco carnoso, emisferico-convesso poi appianato, con l'orlo inizialmente involuto poi disteso, con la cuticola vellutata, asciutta, screpolata col tempo secco e mostrante la sottostante carne giallastra o rossa in alcuni esemplari a cappello bruno, di colore variabile dal rosso sangue tipico al rosso bruno, bruno, bruno nero, rosso-rosa, rosa, arancio laterizio, ocraceo, grigio rossastro, grigio-oliva.

Tuboli adnati e quasi decorrenti, di colore giallo limone, poi giallo-verdi, viranti lentamente al blu al taglio.

Pori concolori ai tuboli, lentamente blu al tocco

Il gambo, fino a 8 cm di altezza, è cilindrico, slanciato, spesso anche corto e tozzo, con la base attenuata e anche radicante, di colore giallo in alto e rosso-rosa verso il basso, ma anche interamente rosso o giallo, ricoperto da una punteggiatura o striato longitudinalmente, oppure ancora con un abbozzo di reticolo.

La carne è soda e compatta nel giovane, poi molle e fibrosa, di colore giallo (rosa-rossastra negli esemplari a cappello non rosso); alla base del gambo sono spesso presenti delle tipiche punteggiature rosso-vermiglio, carota o corallo, appena visibili o più evidenti o ancora collassate e sparse per tutta la base. Lentamente virante al blu alla sezione, senza sapore o odore significativi.

Autore della scheda - MILANI FELICE

Autore delle foto - Pinton Franco Flavio