

SCHEDA N° 0101

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Agrocybe</i>	SPECIE <i>A. cylindracea</i>	AUTORE (DC.) Maire
DATA DI RACCOLTA 10/04/2014	LUOGO DI RACC. parco cittadino	COMUNE Castelfranco Veneto
ALTITUDINE S.L.M. 43 mt.	I.G.M. II 104	RACCOLITORE Pinton Franco Flavio

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: PARCO CITTADINO CON LATIFOGLIA		☐ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO ☒ MORTO	PIOPPO

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: canneto di bambouk

NOTE: esemplari crescenti su frustuli di una ceppaia degradata di pioppo

MICROSCOPIA: Spore 8-10 × 4,5-6 µm, ellittiche, bruno-rugginose in massa.

BIBLIOGRAFIA: AMB vol 1a pag. 247, Funghi d'Italia Zanichelli pag.276 al 749.

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



AGROCYBE CYLINDRACEA



AGROCYBE CYLINDRACEA




AGROCYBE CYLINDRACEA



AGROCYBE CILINDRACEA



AGROCYBE CYLINDRACEA



SPORE

DESCRIZIONE

Agrocybe cylindracea

Ordine: Agaricales
Famiglia: Bolbitiaceae
Genere: *Agrocybe*
Sottogenere: *Aporus*
Specie: *Cylindracea*

Cappello: fino a 15 cm di diametro, da emisferico a convesso-piano, color bruno fulvo da giovane per schiarire alla maturazione con tonalità che vanno dal beige al marroncino fino al biancastro, spesso con zona discale più scura. Cuticola lievemente corrugata e spesso fessurata per la siccità, mentre a tempo umido si presenta un po' untuosa.

Lamelle: adnate o appena decorrenti con dentino, alte, fitte e di colore bianco-beige, poi grigio-brunastro ed infine color tabacco per le spore mature. Intervallate da numerose lamellule.

Carne: compatta, bianca o leggermente bruna, odore gradevole di vinaccia, sapore buono e gustoso.

Gambo: 3-15 cm × 0,5-2 cm, cilindrico leggermente affusolato alla base colore bianco poi ocreo, fibroso e consistente, da bianco a brunastro per la sporata, rivestito da minute fibrille longitudinali, con anello carnoso persistente.

Spore: 8-10 × 4,5-6 µm, ellittiche, bruno-rugginose in massa.

Habitat: in gruppi cespitosi, dalla primavera all'autunno inoltrato sui tronchi marcescenti, specialmente di pioppo vecchi (ma anche vivi) di molte altre latifoglie come olmo, sambuco, salice, a tempo mite ed umido.

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Pinton Franco Flavio