

## COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SCHEDA N° 0049		ORDINE Agaricales
GENERE Amanita	SPECIE A. pachyvolvata	AUTORE (Bon) Krieglest.
	LUOGO DI RACC. colline di cavaso del T	COMUNE Cavaso del tomba PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 600	<b>I.G.M.</b> I 083	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton
HABITAT:		
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: LATI-AGHIFOGLIE		□ FITTO
DENTRO AL BOSCO	AI MARGINI DEL BOSCO	
☐ SU LEGNO	□ VIVO □ MORTO D	I
ESPOSIZIONE:		SA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO	☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: abete bianco-rosso, castagno, ciliegio		
Note: due soli carpofori molto interrati tra l'erba e aghi di Abies alba. in periodo siccitoso		
MICROSCOPIA: spore globose 9-10x11-13 um non amiloidi, subimenio filamentoso		
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli a pag. 30 al n°26		
DETERMINATORE Franco Flavio Pinton  RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI		
AMANITA PACHYVOLVATA 1	A.PACHYVOLVATA CAPPELLO STRIATURE MOLTO EVIDENT	
A.PACHYVOLVATA CAPPELLO LISCIO E LUCENTE	BASIDI TETRASPORICI	SPORE X1000 IN IMMERSIONE



## COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



## DESCRIZIONE

AMANITA PACHYVOLVATA (Bon) Krieglsteiner

Tassonomia:

Classe: Basidiomycetes Ordine: Agaricales Famiglia: Amanitaceae Genere: Amanita Specie: A.pacyvolvata

sezione Amanitopsis (Roze) Konrad et Maubl..\_ Stipite non bulboso, con anello obliterato, subito evanescente, velo generale da

membranoso a submembranoso con o senza u.a.f.

CAPPELLO: 60-120mm di diametro, prima convesso poi piano, raramente umbonato, di colore grigio, grigio-brunastro, più scuro al centro e verso il margine, traslucido; questi e lungamente e profondamente striato.

LAMELLE: poco fitte e di colore bianco, raramente inercalate da lamellule.

GAMBO: 120-180 x 10-30 mm cilindrico, attenuato all'apice, leggermente ingrossato alla base, regolare, di colore bianco-grigiastro, sovente ricoperto da fiochettature o zebrature concolori, all'inizio farcito, cavo con l'età.

CARNE: morbida ed immutabile di colore bianco, senza adori o sapori caratteristici.

VOLVA: molto ampia ed inguainante, alta sul gambo, di colore bianco, sovente macchiata di brunastro.

HABITAT: di norma cresce solitaria o in alcuni esemplari nei boschi di latifoglia con preferenza per la roverella ed il castagno su suolo acidofilo. dalla primavera all'autunno

SPORE: di forma sferica, 9-13 micron di larghezza, non amiloidi.

BASIDI: di forma leggermente clavata, corti lunghi in media 60 micron, tetrasporici.

VELO GENERALE: formato da ife filamentose intrecciate e settate, di larghezza 3,5-8 micron.

CARPOFORI carpofori da me reperiti in due soli esemplari vicini, in prossimità di abete bianco; molto interrati. Poco comune.

Foto di: Franco Flavio Pinton