

SCHEDA N° 0007

ORDINE Agaricales

GENERE Amanita	SPECIE A.franchetii forma queletii	AUTORE Bon et Dennis	
DATA DI RACCOLTA 23-05-2010	LUOGO DI RACC. colline di Possagno	COMUNE Possagno	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 650	I.G.M. III 083	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO LATIFOGIE CARPINUS CASTAGNO		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Castagno Carpino Acero

NOTE: pochi esemplari, ma molto ben sviluppati, tra l'erba e foglie secche di giovani castagni. dove scola l'acqua piovana

MICROSCOPIA: spore largamente ellissoidali; 7-9x5,5-7 um

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli a pag.40 n°56

DETERMINATORE Franco Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



AMANITA FRANCHETII FORMA QUELETII



AMANITA FRANCHETII FORMA QUELETII



AMANITA FRANCHETII F. QUELETII PARTICOLARE CAPPELLO CON VERRUCCHE



A. FRANCHETII F. QUELETII



A. FRANCHETII F. QUELETII PART DI GAMBO



A. FRANCHETII F. QUELETII CAPPELLO CON VERRUCCHE

DESCRIZIONE

AMANITA FRANCHETII forma queletii

Tassonomia:

Classe: Basidiomycetes

Ordine: Agaricales

Famiglia: Amanitaceae

Genere: Amanita

Specie: franchetii f. queletii

Sezione: Validae Fr.- Velo generale friabile, ridotto sul pileo in placche farinose, volva oblitterata o circoncesa

Cappello: 4-8 cm; da emisferico a convesso, poi pianeggiante bruno olivastro; superficie umida, cosparsa +_ fittamente da verruche gialle, grigiastre con il secco.

Lamelle: bianche

Gambo: 5-10 x1-3 cm; subcilindrico, base con bulbo napiforme; biancastro, subliscio o con fioccosità giallognole.

Anello: membranoso, ampio; bianco, orlato da fiocchi giallastri.

Volva: friabile, ridotta in rilievi braccialiformi sopra il bulbo, giallognoli.

Carne: bianca

Spore: largamente ellissoidali; 7-9x6-7 um.

Habitat: cresce in estate-autunno, in boschi di latifoglie e misti. abbastanza comune.

gli esemplari da me raccolti erano pochi ma molto ben sviluppati in prossimità di altre Amaniti. tra le foglie, sotto giovani castagni in un piccolo avallamento ove scorre abbondante acqua piovana. dopo un periodo molto siccitoso seguito da abbondanti piogge.

Foto di: Franco Flavio Pinton