

SCHEDA N° 0207

ORDINE Agaricales

GENERE Amanita	SPECIE Gracilior	AUTORE Bas & Honrubia 1982	
DATA DI RACCOLTA 28-10-2017	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 5	I.G.M. I 48	RACCOGLITORE Cds Gmc	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: AGHIFOGLIA-LATIFOGLIA MISTA | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Piante di aghi - latifoglia, Pinus -leccio

NOTE: Stazione di crescita, simbiote, singola o più esemplari su terreno umido e sabbioso sotto Pinus-Leccio

MICROSCOPIA: 10 - 12 × 5.5 - 6.5 µm da ellissoidali a cilindriche

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag. 42 al N° 60 i nostri funghi le Amanite Erica G. Merlo-Mido Traverso a pag.125

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



AMANITA GRACILIOR



AMANITA GRACILIOR



AMANITA GRACILIOR



AMANITA GRACILIOR



AMANITA GRACILIOR

DESCRIZIONE

Amanita Gracilior

Ordine: Agaricales

Famiglia: Amanitaceae

Genere: Amanita

Specie: Gracilior

Sezione: Lipidella (E.J. Gilbert) Corner et Bas (sez. Roanokense Singer) Margine del pileo + - appendicolato,velo generale friabile, volva indistinta, anello cremoso o membranoso.

Sinonimi: Amanita baccata var. gracilior (Bas & Honrubia) Aparici & Mahiques

Capello: 4-9 cm. emisferico, convesso a piatto, colore bianco, tendente a diventare giallastro-brunastro, ricoperto da verruche coniche e subcorticali, bianche che possono essere rimosse alla manipolazione, margine spesso e leggermente traboccante.

Lamelle: libere, piuttosto larghe, e di colore da bianco a crema, le branchie sono più abbondanti

Carne: spessa, biancastra, sapore dolce, odore sgradevole

Gambo: 8-12 x 1-3 cm. subcilindrico e bianco con un bulbo fusiforme, allungato, e radiceforme, nella metà inferiore con molte piccole, ricurve squame provocate dai resti di volva appena sopra la base radicante.
Anello; alto, membranoso, fragile, lacerato ma persistente.
Volva; fragile, dissociata in scaglie verrucose alla sommità del bulbo basale.

Spore: 10-12 x 5,5-6,5 µm amiloide e allungate, i morsetti sono presenti alla basi dei basidi.

Habitat: in autunno in boschi misti, simbiote , singola o più esemplari su terreni sabbiosi in ambiente mediterraneo, sotto Pinus-Leccio.

Autore della scheda: Cerantola Bruno

Autore delle foto: Dino G. Cerantola - Franco Flavio Pinon