

SCHEDA N° 0111

ORDINE Agaricales

GENERE Amanita	SPECIE <i>A. strobiliformis</i>	AUTORE (Paulet ex Vittad.) Bertill.	
DATA DI RACCOLTA 15/07/014	LUOGO DI RACC. colli Asolani	COMUNE di Maser	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 300	I.G.M.	RACCOGLITORE Franco Flavio Pnton	

HABITAT:

☐ PRATERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☒ MARGINI DI STRADA
☒ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	☐ LUNGO SENTIERO UMIDO SOTTO PINUS
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : MISTO AGHI-LATIFOGIE		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Pinus

NOTE : reperita stazione di crescita di due esemplari ai margini di sentiero collinare su lettiera di Pinus, in zona umida ed ombrosa

MICROSCOPIA: spore 11,25-13 x 6,5-8 µ elissoidali, lisce, ialine, amiloidi. basidi tetrasporici senza giunti a fibbia

BIBLIOGRAFIA : Funghi D'Italia A.M.B. vol.3 di G. Consiglio e C. Papetti alla pag.1133 Funghi D'Italia Zanichelli pag.42 n° 57

DETERMINATORE c.d.s. G.M.C

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




AMANITA STROBILIFORMIS




AMANITA STROBILIFORMIS




AMANITA STROBILIFORMIS



BASIDIO E BASIDIOLO



SPORE



SPORE

DESCRIZIONE

Amanita strobiliformis

Ordine: Agaricales
Famiglia: Agaricaceae
Genere: Amanita
Specie: strobiliformis
Sezione: lepidella (E.J. Gilbert) Corner et Bas
Sottosezione : Solitariae Bas

Cappello: 8-16 cm; da globoso a convesso-pianeggiante; bianco; margine appendicolato dai resti del velo parziale cremoso; superficie liscia, umida, brillante, ricoperta da placche feltrose, tronco-coniche o piramidali bianche poi grigiastre

Lamelle: libere abbastanza fitte, ventricose bianco-crema- latte, con il filo concolore fioccoso.

Volva: friabile, ridotta in frammenti farinosi sulla sommità del bulbo basale; biancastra.

Carne: soda, biancastra, compatta e fibrosa nel gambo. immutabile. odore e sapore non significativi.

Gambo: 10-20 x 2-3,5 cm; robusto; cilindrico, con base dilatata in un grosso bulbo napiforme ± marginato; bianco.

Anello: biancastro, fioccoso-cremoso, evanescente.

Spore: 11,25-13 x 6,5-8 µ elissoidali lisce, ialine, amiloidi, basidi tetrasporici, senza giunti a fibbia.

Habitat: cresce in estate e in autunno; in zone erbose, lungo i sentieri, preferibilmente sotto latifoglie su terreno calcareo. poco frequente.

Autore della scheda: c.d.s. G.M.C

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton

Note: reperito stazione di crescita di soli due esemplari ai margini di un sentiero collinare. su lettiera di pino in zona umida e ombrosa sui colli Asolani il 15 luglio 2014. altitudine 300m.