

SCHEDA N° 0176

ORDINE Agaricales

GENERE Amanita subnudipes	SPECIE A. subnudipes	AUTORE (Romagn.) Tulloss	
DATA DI RACCOLTA 02-06-2016	LUOGO DI RACC. Monfenera	COMUNE Pederobba	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 700 mt.	I.G.M. II 083	RACCOGLITORE Pinton F. - Cerantola G. D.	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: MISTO LATIFOLIA | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Castanea-Quercus-Betulus

NOTE: Stazione di crescita di pochi esemplari ravvicinati, in habitat collinare col secco, ma dopo un abbondante pioggia.

MICROSCOPIA: Spore bianche in massa, lisce, non amiloidi, globose, 10-11 × 9,5-10,5 µm.

BIBLIOGRAFIA: I Funghi dal vero Bruno Cetto vol.7 al 2586, Funghi d'Italia Zanichelli pag.28 al 20.

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




AMANITA SUBNUDIPES



AMANITA SUBNUDIPES 1



AMANITA SUBNUDIPES 2



BASIDI + BASIDIOLI



SPORE

DESCRIZIONE

Amanita subnudipes

Ordine: Agaricales
Famiglia: Amanitaceae
Genere: Amanita
Specie: Subnudipes
Sezione: Amanitopsis

Cappello: 4 – 8 cm. inizialmente campanulato poi convesso e infine disteso-appianato, con largo umbone, finemente striato nell'estrema zona marginale. Cuticola separabile, liscia, lucente, generalmente priva di velo, abbastanza uniforme con colori sui toni dell'aranciato-rosa, aranciato-giallo, anche giallo albicocca.

Lamelle: separate dal gambo, serrate e minute, biancastre o crema, con numerose lamellule.

Carne: biancastra, tenera nel cappello, fibrosa-midolloso nel gambo, con odore e sapore debole, gradevole.

Gambo: 8-12 × 1-1,5 cm, slanciato, cilindrico con apice attenuato, liscio non ricoperto da fioccosità. Anello assente. Volva minuta sul gambo, strettamente ancorata alla base dello stipe, svasata in alto, biancastra all' esterno, ed ocre pallido all' interno.

Spore: bianche in massa, lisce, non amiloidi, globose, 10-11 × 9,5-10,5 µm.

Habitat: cresce nel periodo estivo in boschi termofili di conifere e latifoglie, con preferenza per querce e castagni.

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Pinton Franco Flavio