

SCHEDA N° 0292

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Armillaria</i>	SPECIE <i>A. mellea</i>	AUTORE (Vahl) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 08-11-2021	LUOGO DI RACC. Cà Marcello Levada	COMUNE Piombino Dese	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. IV 127	RACCOGLITORE Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: MISTO AGHI-LATIFOGIE IN PREVALENZA | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO | DI CARPINO IN PARCO PLANIZIALE |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: filari di Carpini

NOTE: in prossimità di una grande ceppaia marcescente di Carpino, di un viale alberato del parco

MICROSCOPIA: spore da ellissoidali a obovoidali, lisce 7-8,6 x 5,4-6 um, basidi senza giunti a fibbia

BIBLIOGRAFIA: funghi d'Italia Zanichelli pag. 164 al n° 404 funghi d'Italia A.M.B. vol. 1 pag. 44

DETERMINATORE Dino Cerantola Franco Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



ARMILLARIA MELLEA



ARMILLARIA MELLEA



ARMILLARIA MELLEA



ARMILLARIA MELLEA



ARMILLARIA MELLEA



ARMILLARIA MELLEA

DESCRIZIONE

Armillaria mellea

Ordine: Agaricales
Famiglia: Physalacriaceae
Genere: Armillaria
Specie: A. mellea
Sezione:

Sinonimi: Agaricites melleus (Vahl) Mesch., Syll. fung. (Abellini) 11: 657 (1895)
Agaricus melleus Vahl, Fl. Danic. 6(17): tab. 1013 (1790)

Cappello: 3-15 cm, da convesso-campanulato a piano-depresso, ± umbonato; superficie giallo-ocraceo, color miele, talora con sfumature rossicce o olivastre, ricoperta da piccole squame feltrose più fitte al centro che risulta più scuro.

Lamelle: ± fitte, adnato-decorrenti, da biancastre a brune, arcuate, macchiate di oca-brunastro con l'età.

Carne: abbastanza consistente, biancastra, odore fungino-spermatico e sapore analogo.

Gambo: 3-15 x 0,5-1,5 cm, cilindrico, flessuoso, biancastro, più scuro, brunastro alla base, dotato di ampio anello membranoso ornato di giallo.

Spore: da ellissoidali a obovoidali, lisce 7-8,6 x 5,4-6 µm, basidi senza giunti a fibbia.

Habitat: in autunno, parassita di latifoglie piuttosto tardivo, abbondante comune.

Autore della scheda: Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton

Autore delle foto: Dino Cerantola