

SCHEDA N° 0116

ORDINE Boletales

GENERE Boletus	SPECIE B. radicans	AUTORE Pers.: Fr.	
DATA DI RACCOLTA 15-07 05-08	LUOGO DI RACC. colli Asolani	COMUNE Maser	PROV. (TV)
ALTITUDINE S.L.M. 300-350	I.G.M. II 083	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

HABITAT:

☐ PRATIERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : LATIFOGIE CARPINUS-QUERQUS PUBESCENS		☒ RADO ☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE: ☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Carpinus-Quercus pubescens

NOTE : pochi esemplari sparsi, singoli o in coppia su terreno calcareo in diversi periodi siccitosi, da luglio ai primi di settembre

MICROSCOPIA: spore ellissoidali 10-16x4,5-5,5µ gialle al microscopio verde oliva in massa

BIBLIOGRAFIA : A.M.B. funghi d'Italia vol. 1 pag. 370 Zanichelli pag.484 al n°1365

DETERMINATORE GMC Castellano

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



BOLETUS RADICANS




BOLETUS RADICANS




BOLETUS RADICANS



BOLETUS RADICANS



BASIDIO E BASIDIOLI



SPORE

DESCRIZIONE

Boletus radicans

Ordine: Boletales
Famiglia: boletaceae
Genere: *Boletus*
Specie: *radicans*
Sezione: Calopodes Fr.

Cappello: 8-16-20 cm; da subgloboso a convesso-guancialiforme; superficie $\pm$ rugolosa, finemente vellutata, un po' viscida a tempo piovoso, da biancastra a crema-grigiasta, beige-pallido, imbrunente con l'età.

Tubuli: lunghi, liberi, gialli, bluastri alla pressione; pori piccoli, gialli, olivastri al tocco e alle abrasioni, sfumati di arancione con l'età.

Gambo: 6-12 x 5-12 cm; subbulboso, poi obeso, claviforme con base $\pm$ radicante, da biancastro a giallo-pallido, talvolta debolmente sfumato di rosso, imbrunisce al tocco e alla manipolazione; nella parte superiore è presente un fine reticolo concolore.

Carne: biancastra, un po' rosata alla base, azzurra $\pm$ intenso al taglio, poi livido-grigiastro; odore poco gradevole, sapore amaro.

Spore: elissoidali 10-13x4,5-5,5 μ gialle al microscopio verde oliva in massa, fino 16 μ .

Habitat: estate-autunno; in boschi caldi a quote non molto elevate, sotto diverse latifoglie, soprattutto querce, su terreno calcareo.

Autore della scheda: GMC Castellano

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton