

SCHEDA N° 0210

ORDINE Boletales

GENERE <i>Butyriboletus</i>	SPECIE <i>B. appendiculatus</i>	AUTORE (Schaeff.) D. Arora & J.L. Frank	
DATA DI RACCOLTA 16/07/2017	LUOGO DI RACC. Mostaccin	COMUNE Maser	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 480	I.G.M. III 084	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO LATIFOGLIA QUERCUS PUBESCENS- CASTAGNO		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI <input type="checkbox"/>

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Quercia, Castagno, Carpino

NOTE: Stazione di crescita di alcuni esemplari in bosco termofilo, su terreno argilloso, in prossimità di roverella e castagno

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali fusiformi, lisce, 10-13,5x4-5 μ sporata bruno-oliva

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag. 482 al n° 1355 - Funghi d'Italia A.M.B. vol 1 pag. 372

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



DESCRIZIONE

Butyriboletus appendiculatus

Ordine: Boletales

Famiglia: Boletaceae

Genere: *Butyriboletus*

Specie: *B. appendiculatus*

Sezione: *Appendiculati* Konrad et Maub. - Carne per lo più giallastra, immutabile o ±verde-azzurrognola al taglio; pori fini giallastri, verde-bluastro alla pressione; stipite talvolta con toni rossastri, con reticolo.

Sinonimi: *Boletus appendiculatus* Schaeff.
Dictyopus appendiculatus (Schaeff.) Quéf.
Suillus appendiculatus (Schaeff.) Kuntze

Cappello: 5-18 cm; emisferico, poi piano convesso, infine guancialiforme; superficie finemente vellutata, opaca, leggermente untuosa a tempo piovoso, di colore bruno-nocciola, marrone ± scuro con cuticola talvolta debordante al margine.

Tubuli: corti e fini, giallastri, azzurrognoli al tocco, annessi al gambo.

Pori: fitti, concolori al gambo, rotondi e piccoli, al tocco virano al blu-verdastro.

Carne: soda, bianco-giallino, debolmente verde-azzurrognolo al taglio, nella base del gambo rosata o rosata tendente al marrone, prevalentemente bluastra nel cappello quando esposta all'aria; odore e sapore gradevoli.

Gambo: 5-15 x 3-6 cm, massiccio, obeso, giallo o giallo-citrino, ricoperto di fine reticolo concolore, con base assottigliata-radiciforme, con tendenza a macchiarsi verso la base di bruno-rossiccio, superficie del gambo blu quando è ammaccato.

Spore: ellissoidali fusiformi, olivastre in massa, lisce, 11-15 x 5-6 µm.

Habitat: solitario o anche in piccoli gruppi, nei boschi di latifoglie (specialmente castagno e quercia), su terreni calcarei. in estate autunno.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola