

SCHEDA N° 0234

ORDINE Boletales

GENERE <i>Butyriboletus</i>	SPECIE <i>B. pseudoregius</i>	AUTORE (Heinr. Huber) D. Arora & J.L. Frank	
DATA DI RACCOLTA 01/07/2018	LUOGO DI RACC. Col Mostaccin	COMUNE Maser	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 474	I.G.M. III 084	RACCOGLITORE Bandiera Lorenzo	

HABITAT:

<input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO DI LATIFOGLE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Castagni, Farnie, Betulle

NOTE: specie simbiote in tre esemplari, sotto Quercus, in vicinanza con *Leccinum versipelle* (Fr.) Snell

MICROSCOPIA: spore fusiformi 11-13,5 x 4,5-5 µm. gialle al M.S. sporata bruno oliva.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag 482, fig. n°1358. - AMB vol. 2 pag. 895

DETERMINATORE C.D.S. GMC

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



BUTYRIBOLETUS PSEUDOREGIUS



BUTYRIBOLETUS PSEUDOREGIUS



BUTYRIBOLETUS PSEUDOREGIUS



BUTYRIBOLETUS PSEUDOREGIUS



BUTYRIBOLETUS PSEUDOREGIUS

DESCRIZIONE

Butyriboletus pseudoregius

Ordine: Boletales

Famiglia: Boletaceae

Genere: *Butyriboletus*

Specie: *B. pseudoregius*

Sezione: Appendiculati: Konrad et Maub.

Sinonimi: *Boletus pseudoregius* (Heinr. Huber) Estadès
Boletus appendiculatus subsp. *pseudoregius* Heinr. Huber

Capello: Emisferico colore e superficie pileica che appare rosa, rosa antico, con sfumature oca-fulvastre.

Tubuli : lunghi, adnato-subliberi, gialli poi olivastri; pori molto piccoli, tondi, gialli, giallo-olivastro a maturità si macchiano di bruno e di verde -azzurro alle abrasioni.

Carne: Soda, giallo pallido, talvolta sfumata di rossastro verso la base, debolmente azzurognola al taglio.

Gambo: giallo, su cui risalta, nella parte mediana la presnza +o- estesa di una zona rossastra di forma circolare.

Spore: fusiformi 11-13,5 x 4,5-5 µm. gialle al M.S. sporata bruno oliva.

Habitat: simbionte, isolato o a gruppi, poco numerosi sotto latifoglie in prevalenza Castagni, Farnie, Betulle, dall'estate al primo autunno, su terreno neutro o moderatamente acido.

Autore della scheda: Bandiera Lorenzo

Autore delle foto: Bandiera Lorenzo