

SCHEDA N° 0170

ORDINE Pezizales

GENERE Caloscypha	SPECIE C. fulgens	AUTORE (Pers. : Fr.) Boud.	
DATA DI RACCOLTA 14-04-2016	LUOGO DI RACC. Val di Sella	COMUNE Borgo Valsugana	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 960 mt.	I.G.M. III 061	RACCOGLITORE Pinton F. / Cerantola G.	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: MISTO LATIFOGLIA/AGHIFOGLIA | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Faggio, Abete rosso ed Abete bianco.

NOTE: piccoli ascocarpi in zona umida e muscosa sotto abete rosso

MICROSCOPIA: spore subsferiche con dimensioni medie di 5-6 µm, lisce e ialine, uniseriate nell'asco, aschi 110x10 µm.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia A.M.B. vol.2 a pag.984 - I Funghi dal vero Bruno Cetto vol.3 al 1211 Ascomiceti d'Italia pag. 24.

DETERMINATORE Cds Gmc.

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CALOSCYPHA FULGENS




CALOSCYPHA FULGENS 2




CALOSCYPHA FULGENS 3



CALOSCYPHA FULGENS 4



ASCHI CON SPORE



SPORE

DESCRIZIONE

Caloscypha fulgens

Ordine: Pezizales
Famiglia: Caloscyphaceae
Genere: *Caloscypha*
Specie: *fulgens*
Sezione:

Ascocarpo: fino a 4 cm di diametro, a forma di apotecio, da sessile a brevemente stipitato, all'inizio quasi chiuso, subgloboso, poi sempre più aperto a coppa e sempre più irregolare, con orlo che tende a fessurarsi. Superficie esterna pruinoso, dal giallo all'arancio e con tipici riflessi blu-verdastri, più evidenti a seguito della manipolazione.

Imenoforo: superficie liscia o leggermente rugosa, da giallo vivo fino all'arancio nei vecchi esemplari.

Carne: esigua e fragile, a consistenza ceracea, di colore arancio e con odore e sapore nulli.

Spore: subsferiche con dimensioni medie di 5-6 µm, lisce e ialine.
Aschi 110 x 10 µm otosporici, Parafisi filiformi, cilindriche e biforcute alla base, contenenti abbondanti pigmenti carotenoidi.

Habitat: Specie primaverile tipica dei boschi di conifere e misti. Cresce solitamente nei punti più umidi, spesso tra i rami marcescenti o infissa nella lettiera di aghi.

Autore della scheda: Pellizzari Renato

Autore delle foto: Cerantola Giuseppe / Pinton Franco Flavio.