

SCHEDA N° 0284

ORDINE Helotiales

| | | | |
|------------------------------------|---|--|-----------------|
| GENERE <i>Ciboria</i> | SPECIE <i>C. amentacea</i> | AUTORE (Balb.) Fuckel | |
| DATA DI RACCOLTA 03-04-2011 | LUOGO DI RACC. Fietta del Grappa | COMUNE Crespano del Grappa | PROV. TV |
| ALTITUDINE S.L.M. 75 s.l.m. | I.G.M. 083- III | RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton | |

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: MISTO DI LATIFOGIE PREVALENTE ALNUS

- | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> RADO | <input checked="" type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

SU AMENTI FEMMINILI DEGRADATI I DI ALNUS

- ESPOSIZIONE:** ASSOLATA OMBROSA MEDIA

- UMIDITA' DEL TERRENO** ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: carpini- aceri- ontani- alnus

NOTE: tipico ascoma che cresce su amenti marcescenti femminili di Alnus, in ambienti molto umidi e ombrosi

MICROSCOPIA: spore ovoidali o irregolarmente ellissoidali, 9 x 4-5 µm, lisce, ialine non guttulate aschi 130 x 9 µm.

BIBLIOGRAFIA: Ascomiceti d'Italia A.M.B. Gianfranco Medardi pag.32

DETERMINATORE Franco Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CIBORIA AMENTACEA_ASCOMI



C.AMENTACEA




C. AMENTACEA



C. AMENTACEA



C. AMENTACEA



MICROSCOPIA

- 1- Esporas en agua
- 2- Esporas en agua y contraste de fases
- 3- Esporas en azul de lactofenol
- 4, 5- Esporas en las ascas
- 6, 7- Parafisos y reacción con Melzer
- 8- Excipulum

DESCRIZIONE

Ciboria amentacea

Ordine: Helotiales
Famiglia: Sclerotiniaceae
Genere: Ciboria
Specie: C. amentacea
Sezione:

Sinonimi: Hymenoscyphus amentaceus (Balb.) W. Phillips
Peziza amentacea Balb.
Rutstroemia amentacea (Balb.) P. Karst.

Ascoma: di piccolissima taglia apotecio stitipato, fino a 10 mm di diametro e 25 mm di altezza. Cupolato, dapprima semichiuso, poi più aperto. Imenoforo liscio, ocrea o ocrea-brunastro; superficie esterna liscia, debolmente pruinoso, concolore. Orlo regolare con corte appendici biancastre, che gli conferiscono un aspetto più o meno dente

Carne: esigua, sottile, fragile, ceracea, ocrea-brunastra.

Gambo: molto sottile, meno di 1 mm di spessore, più o meno cilindraceo, in alto concolore la superficie esterna, in basso leggermente più scuro.

Spore: spore ovoidali o irregolarmente ellissoidali, 9 x 4-5 µm, lisce, ialine non guttulate uniseriate nell'asco. aschi 130 x 9 µm, cilindraceo-claviformi, amiloidi, ottosporici; parafisi sottili, cilindracee solo leggermente allargate in alto. cresce in pochi, od alcuni esemplari.

Habitat: cresce tipicamente su amenti femminili marcescenti di Alnus, nei luoghi umidi e ombrosi; fine inverno, inizio primavera.

Autore della scheda: Franco Flavio Pinton

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton