

SCHEDA N° 0139

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Clitocybe</i>	SPECIE <i>C. sinopica</i>	AUTORE (Fr.) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 09/04/2015	LUOGO DI RACC. Parco cittadino	COMUNE Castelfranco Veneto	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 96	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI : AGHI-LATIFOGLIE | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | PRATO ERBOSO IN BOSCHETTO CITTADINO |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Aceri-Cedrus

NOTE : stazione di crescita di pochi esemplari isolati e vicini

MICROSCOPIA: spore ellissoidali, ialine lisce 7-9 x 4,2-6 µ basidi tetrasporici sporata biancastra

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia Zanichelli Pag.150 al 356 - Funghi d'Italia A.M.B. Vol. 2 a pag. 562

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CLITOCYBE SINOPICA



CLITOCYBE SINOPICA




CLITOCYBE SINOPICA



CLITOCYBE SINOPICA



SPORE



BASIDIO E TRAMA LAMELLARE

DESCRIZIONE

Clitocybe sinopica

Ordine: Agaricales
Famiglia: Tricholomataceae
Genere: Clitocybe
Specie: C. sinopica
Sezione: Infundiliformes

Cappello: 3-8 cm. convesso, piano nella zona centrale, ± inbutiforme, decorato da piccole e fitte squamette poco evidenti, cuticola asciutta, finemente squamulosa, opaca, di colore bruno-arancio, bruno-ocra-rossastro, margine involuto poi irregolare e sottile, liscio nel giovane, poi in vecchiaia ondulato, lobato.

Lamelle: fitte, sinuose, con lamellule, leggermente decorrenti e arcuate, biancastre in tenera età, crema pallido con riflessi giallognoli a maturazione, filo concolore e liscio.

Carne: fibrosa nel cappello, stopposa nel gambo, tenace e quasi coriacea nella zona corticale. Biancastra, con sfumature rossastre sotto la cuticola. Odore e sapore di farina fresca.

Gambo: 3,6 × 0,8 cm, concolore al cappello o appena più chiaro, cilindrico, leggermente ingrossato in basso, di buona consistenza, pieno o farcito, con superficie liscia di aspetto setoso-fribilloso, ricoperto da una pruina biancastra all'apice e la base spesso ricoperta di rizoidi miceliari bianchi.

Spore: elissoidali con superficie liscia, ialine, 7-10 X 4,5-6,5 µm. basidi tetrasporici.

Habitat: cresce isolata o gregaria in mezzo al muschio in primavera-estate.

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton