

SCHEDA N° 0068

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Coprinus</i>	SPECIE <i>C. comatus</i>	AUTORE (Müll.: Fr.) Pers.	
DATA DI RACCOLTA 15-11-2011	LUOGO DI RACC. Colli di Possagno	COMUNE Possagno	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 400	I.G.M. II 083	RACCOGLITORE PELLIZZARI RENATO	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input checked="" type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: BOSCO DI LATIFOGLIA | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Castanea, Fagus, Quercus

NOTE: Funghi trovati al margine di una mulattiera .

MICROSCOPIA: 12x7µm

BIBLIOGRAFIA: Papetti C., G. Consiglio - ATLANTE FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA , volume 1 pag. 284.
Bruno Cetto - FUNGHI DAL VERO - n.37.

DETERMINATORE PELLIZZARI RENATO

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



COPRINUS COMATUS



COPRINUS COMATUS1



COPRINUS COMATUS2



COPRINUS COMATUS3



COPRINUS COMATUS4

DESCRIZIONE

Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Pers.

Ordine : Agaricales
Famiglia : Coprinaceae
Genere : *Coprinus*
Specie : *Comatus*

Nome volgare
Coprino chiomato, Agarico chiomato, Fungo dell'inchiostro.

Dal latino *comatus* = chiomato. Per le squame filamentose che ricoprono l'apice del cappello come una chioma.

Cappello: 5÷15(22) × 3÷7 cm, dapprima ovoidale-oblungo o a forma di clava, ricopre una gran parte del gambo al quale aderisce con le lamelle; poi si apre a forma di stretta campana, con il margine che si lacera, si arrotola a riccio verso l'alto e comincia a liquefarsi.

Superficie inizialmente siricea e bianca poi si lacera in squame da biancastre a bruno chiaro, calotta spesso ocreacea. A maturità diventa molle e si liquefà in una poltiglia nerastra.

Lamelle : Molto fitte, ineguali e molto larghe , libere dal gambo, inizialmente bianche, poi rosate, infine nere e deliquescenti.

Gambo: 10÷15 × 1÷1,5 cm, totalmente cavo, ingrossato alla base e più o meno bulboso. Bianco, poi rosa grigiastro o brunastro, leggermente peloso-fibrilloso.

Presenza di anello minuto, bianco, mobile, membranoso, a volte nero per le spore.

Carne: Molto spessa, tenera nel cappello, fibrosa nel gambo, bianca da giovane e nerastra e deliquescente a maturità.

Spore : nere, elissoidali, 12 x 7 µm

Habitat: Dalla primavera al tardo autunno nei boschi erbosi, concimati, nei giardini, al bordo delle strade, nelle golene, predilige terreno sciolto e sabbioso ricco di materiale calcareo e sostanze organiche.

Autore della scheda: Pellizzari Renato

Autore foto: Pellizzari Renato