

**SCHEDA N° 0206**

**ORDINE Agaricales**

<b>GENERE</b> <b>Coprinus</b>	<b>SPECIE</b> C. picaceus	<b>AUTORE</b> ( Bull.) Gray	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 28/10/2017	<b>LUOGO DI RACC.</b> Bosco Nordio	<b>COMUNE</b> Chioggia	<b>PROV.</b> VE
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 5	<b>I.G.M.</b> I 48	<b>RACCOGLITORE</b> Cds Gmc	

**HABITAT:**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI    | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI                     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                   |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO    | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO         | <input type="checkbox"/> ARENILE                             |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA        | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |  |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                     |
| <b>BOSCO DI:</b> AGHI-LATIFOLGIA MISTA   |  | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO     | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE                |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO        | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI   |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** Varie piante di aghi-latifoglia, Pinus Leccio

**NOTE:** stazione di crescita gregaria, singola o isolata, o in gruppi di numerosi individui. al margine di un viottolo, molto bagnato.

**MICROSCOPIA:** Spore 13-18 x 10-12 µm. ellittiche, largamente ovoidali lisce, con poro germinativo ben distinto, bruno nerastre.

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia Zanichelli pag.390 al 1084 - Funghi d'Italia A.M.B vol 2 a pag 808.

**DETERMINATORE** Cds Gmc

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**COPRINUS PICACEUS**



**COPRINUS PICACEUS**



**COPRINUS PICACEUS**



**COPRINUS PICACEUS**



**COPRINUS PICACEUS**

## DESCRIZIONE

### **Coprinus picaceus**

**Ordine:** Agaricales

**Famiglia:** Coprinaceae

**Genere:** Coprinus

**Specie:** Picaceus

**Sezione:** Picacei (Fr.) Penn. in Kauffman- velo pileico lanoso, caduco, formato da ife cilindriche, ramificate, diverticolate non articolate.

**Sinonimi:** Agaricus picaceus Bull.  
Coprinopsis picacea ( Bull. Fr.)

**Cappello:** 4-10 cm. inizialmente cilindrico ovato, a maturità conico campanulato, infine deliquescente assieme alle lamelle superficie di colore marrone scuro-fuliginoso, bruno-nerastra, ricoperta da placche più o meno ampie disposte disordinatamente, biancastre, fiocose e fibrose, facilmente asportabili, residui di velo generale, cuticola umida e brillante.

**Lamelle:** molto fitte, appressate, unite e ventricose, libere dal gambo, inizialmente biancastre-grigiastre e con orlo fiocoso verso il margine, poi via via ingrigienti fino a nerastre, deliquescente a maturità. Sono presenti brevi e scarse lamellule.

**Carne:** sottile, acquosa, e inconsistente, biancastra poi grigio-cenere nel cappello, biancastra nel gambo facilmente deliquescente. Odore sgradevole molto forte di naftalina, bituminoso o di letame.

**Gambo:** 5-25 x 1-2,5 cm. cilindrico, bulboso alla base e lanoso da bianco a grigio chiaro, ricoperto da zebraure forforacee biancastre non deliquescente, fragile e cavo.

**Spore:** 13-18 x 10-12 µm. ellittiche, lisce, nere in massa con poro germinativo evidente, basidi tetra sporici. cheilocistidi cilindrici.

**Habitat:** dall'estate fino all'autunno in boschi di latifolia o aghifolia ( leccio, orno, pino domestico ) predilige tratti soggetti a degrado e calpestio in terreni umidi e ricchi di humus, solitario in gruppi numerosi.

**Autore della scheda:** Cerantola Bruno

**Autore delle foto:** Dino Giuseppe Cerantola