

SCHEDA N° 0141

ORDINE Agaricales

GENERE Cortinarius	SPECIE C. bolaris	AUTORE (Pers.) Fr.	
DATA DI RACCOLTA 29-08-2015	LUOGO DI RACC. Frassenè Agordino	COMUNE Gosaldo	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1200 mt	I.G.M. 45 II	RACCOGLITORE Pinton Franco Flavio	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: AGHIFOGLIA E LATIFOGLIA | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Fagus

NOTE: stazione di crescita di pochi esemplari singoli, raccolti il 15-08-2014 e 29-08-15 a Gosaldo e Frassenè Agordino.

MICROSCOPIA: Spore ovoidali-subglobose, 6-7 X 5-6 µm, finemente verrucose, con ornamentazione, color bruno-ruggine.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag. 344 al 942, Funghi d'Italia A.M.B. vol. 1 a pag183.

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CORTINARIUS BOLARIS



CORTINARIUS BOLARIS




CORTINARIUS BOLARIS



CORTINARIUS BOLARIS



SPORE



TRAMA IMENIALE

DESCRIZIONE

Cortinarius bolaris

Ordine: Agaricales

Famiglia: Cortinariaceae

Genere: Cortinarius

Specie: Bolairs

Sezione: Leprocybe - Sottogenere Telamonia (Fr.) Trog.

Cappello: fino a 6 cm di diametro, da emisferico a convesso, a volte umbonato, infine disteso, con margine irregolare; superficie pileica asciutta, ricoperto da placche squamulose rossicce, più piccole e fitte al disco, più grandi in periferia, su fondo bianco, giallo o rosato.

Lamelle: da annesso-uncinate fino a leggermente decorrenti, da principio ocre chiaro, poi caffelatte, per finire giallo-bruno-ruggine, mediamente fitte.

Carne: biancastra, ma giallina sotto la cuticola e alla base del gambo, odore lieve, sapore piccante.

Gambo: 5-7 x 0.5-1.2 cm, cilindraceo, attenuato alla base, con colore al cappello, leggermente più chiaro, altrove decorato da squamule e fibrillosità come nel cappello e da residui della cortina, feltrato di bianco alla base.

Spore: ovoidali-subglobose, 6-7 X 5-6 µm, verrucose, con ornamentazioni, color bruno-ruggine.

Habitat: sotto latifoglie, di preferenza querceti e faggete, in estate-autunno, non comune.

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Pinton Franco Flavio