

**SCHEDA N° 060**

**ORDINE Agaricales**

<b>GENERE</b> Cortinarius	<b>SPECIE</b> C. caligatus	<b>AUTORE</b> Malençon	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 12-11-11	<b>LUOGO DI RACC.</b> Bosco Nordio	<b>COMUNE</b> Chioggia	<b>PROV.</b> VE
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 0	<b>I.G.M.</b> I 169	<b>RACCOGLITORE</b> Cerantola, Cadorin, Pellizzari	

**HABITAT:**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI               | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI                     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                              |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO               | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE  |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                   | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |   |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME            | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                                |
| <b>BOSCO DI:</b> LATIFOGIE-AGRIFOGIE                |  | <input type="checkbox"/> RADO <input checked="" type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO                | <input type="checkbox"/> IN RADURE                                      |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                   | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI  |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** Bosco di latifoglie e aghifoglie con lecci e quercie.

**NOTE:**

**MICROSCOPIA:** spore amigdaliformi ± verrucose, 8,5 -12,2 x 5-6,4 µm.

**BIBLIOGRAFIA:** AMB vol. 2 pag. 733 - Zanichelli pag. 316 al 854

**DETERMINATORE** Cerantola, Cadorin, Pellizzari


**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI




CORTINARIUS CALIGATUS




CORTINARIUS CALIGATUS\_1



SPORE



BASIDI



BASIDI\_1

## DESCRIZIONE

*Cortinarius caligatus*

Classe: Homobasidiomycetes

Ordine: Cortinariales

Famiglia: Cortinariaceae

Genere: *Cortinarius* Subgenere

Sezione : Phlegmacium

Specie: *caligatus*.

Cappello: da emisferico a convesso-appianato ± bassamente umbonato, margine involuto, spesso sf4rangiato. Può giungere ad un diametro di una decina di centimetri circa. La cuticola è facilmente separabile, liscia, vischiosa e lucente, grigio-rossastra o fulva con riflessi violetti, più scura al centro da dove si dipartono alcune fibrille radiali.

Lamelle: fitte ed intervallate da lamellule , intensamente violette, adnate, con filo interno concolore.

Gambo. cilindrico, raramente alla base ,talvolta radicante, robusto, ocraceo, ornato da evidenti zone anulari formate da resti del velo, imbrunite. La cortina è bianca e consistente.

Carne: discretamente spessa, soda, bianca, talvolta maculata di brunoscuro verso la base del gambo; con odore debole terroso, sapore mite, dolciastro.

Autori della scheda: Cerantola, Cadorin, Pellizzari.

Autore della foto: Dino Giuseppe Cerantola