

SCHEDA N° 0018

ORDINE AGARICALES

GENERE <b>CORTINARIUS</b>	SPECIE <b>C. HEMITRICUS</b>	AUTORE (PERS. : FR.) <b>FR.</b>
DATA DI RACCOLTA <b>11-11-2010</b>	LUOGO DI RACC. <b>PARCO BOLASCO</b>	COMUNE <b>CASTELFRANCO V.</b> PROV. <b>TV</b>
ALTITUDINE S.L.M. <b>44</b>	I.G.M. <b>II 104</b>	RACCOGLITORE <b>VENTURIN ROMEO</b>

**HABITAT:**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI          | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                   |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO            | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE                             |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                     |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME         | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| BOSCO DI: <b>LATIFOGLIA-AGHIFOGLIA</b>           |  |  |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO         | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO     | <input type="checkbox"/> IN RADURE                           |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI <b>CARPINO</b>  |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: **misto aghi-latifoglia**

NOTE: **Pochi carpofori di piccole dimensioni.**

MICROSCOPIA: **sporata ocra**

BIBLIOGRAFIA: **A.M.B. CORTINARIUS IN ITALIA parte quinta scheda E73**

DETERMINATORE **VENTURIN ROMEO**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI



CORTINARIUS HEMITRICUS\_1



CORTINARIUS HEMITRICUS\_2



SPORATA OCRA

## DESCRIZIONE

Sinonimo. *Telamonia hemetricha* (Pers. : FR.) Wunche

Cappello: Ø 10-50 mm. conico-campanulato, subemisferico, poi convesso, infine appianato, con evidente umbone, da appuntito a ottuso, igrofano, cuticola di colore, grigio-bruno, bruno-scuro, bruno-ocraceo con tempo secco, ricoperto da squamette biancastre provenienti dal velo, con l'età glabrescente con resti di velo solo verso il margine, margine inflesso, appendicolato da resti di una cortina fibrillosa bianca che nel giovane unisce il cappello al gambo.

Lamelle: situate-smarginate uncinatae, fitte intercalate da lamellule, di colore grigio-bruno-pallido, bruno-chiaro, ocracee-brune, filo lamellare intero, a leggermente denticolato, più chiaro.

Gambo: 30-60 mm. cilindrico, ricurvo, uguale o con base leggermente ingrossata, pieno, poi cavo, ornato da un velo bianco lanoso-fioccoso biancastro, su fondo di colore bruno-grigiastro, a brunastro, formante nella parte alta una zona annulaniforme, fugace.

Carne: bruno-ocracea, brunastra alla base del gambo.

Autore della scheda : VENTURIN ROMEO

Autore delle foto - Pinton Franco Flavio