

SCHEDA N° 0281

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Cuphophyllus</i>	SPECIE <i>C. virgineus</i>	AUTORE (Wulfen) Kovalenko	
DATA DI RACCOLTA 01-11-2020	LUOGO DI RACC. Fonte	COMUNE Fonte	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 120	I.G.M. 083 II	RACCOGLITORE Mark Mowlazadeh	

HABITAT:

☒ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO LATIFOGIE		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☒ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Misto latifoglie Carpino, Betulla, Quercia


NOTE: Rinvenuti numerosi esemplari in una porzione di prato in mezzo all'eba non calpestata di un parco giochi

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali a forma di amigdale, 6-11 x 4-8 µm, bianche

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli a pag. 96 al n°202; Hygrophorus, Hygrocybe e Cuphophyllus di E.Campo a pag.164

DETERMINATORE C.d.S. G.M.C.

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



CUPHOPHYLLUS VIRGINEUS



CUPHOPHYLLUS VIRGINEUS




CUPHOPHYLLUS VIRGINEUS



CUPHOPHYLLUS VIRGINEUS



CUPHOPHYLLUS VIRGINEUS, LAMELLE



CUPHOPHYLLUS VIRGINEUS, STRIATURA

DESCRIZIONE

Cuphophyllus virgineus

Ordine: Agaricales

Famiglia: Hygrophoraceae

Genere: **Cuphophyllus**

Specie: C.virgineus

Sezione: Cuphophyllus Donk - Superfici pileica e stipitale asciutte o $\pm$ vischiose, di colore smorto, Bianco, grigio, arancione; margine liscio o striato; lamelle arcuato-decorrenti.

Sinonimi: Agaricus niveus (Scop.)
Camarophyllus niveus (Scop.) Murrill
Hygrocybe nivea (Scop.) Murrill
Omphalia virginea (Wulfen) Gray

Cappello: dimensioni da 1,5 a circa 4 cm, prima emisferico-convesso poi piano e infine depresso; alcuni esemplari presentano un leggero umbone ottuso. Il margine risulta striato per trasparenza, particolare ben visibile soprattutto negli esemplari con cappello appianato. Colore tra il bianco e l'avorio, a volte con una zona leggermente più scura al centro. Al tatto, sensazione ceracea e untuosa con umidità.

Lamelle: di colore bianco, basse e spaziate, consistenza elastico-ceracea.

Carne: fibrosa e biancastra, più esigua nel cappello; non si rilevano odori o sapori particolari.

Gambo: le dimensioni sono molto variabili, ci sono esemplari minuti con gambo più tozzo, altri magari più sviluppati con gambo proporzionalmente più esile e di media lunghezza. Mediamente le misure si attestano tra 0,5-2cm di diametro per una lunghezza di 2,5-8cm. Colore biancastro, talvolta con presenza di sfumature rosate alla base (infezione da muffa Fusarium sp.). Cilindrico, consistenza tenace, attenuato verso la base, asciutto e fibrilloso.

Spore: ellissoidali a forma di amigdale, 6-11 x 4-8 μ m, bianche.

Habitat: nei prati, sia a bassa quota che in collina e montagna; di solito a partire da fine estate fino a tutto l'autunno inoltrato.

Autore della scheda: Mark Mowlazadeh

Autore delle foto: Mark Mowlazadeh