

SCHEDA N° 0233

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Cyclocybe</i>	SPECIE <i>C. aegerita</i>	AUTORE (V. Brig.) Vizzini	
DATA DI RACCOLTA 18/05/2017	LUOGO DI RACC. Vallà	COMUNE Riese Pio X	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 43 mt.	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: PARCO CITTADINO CON LATIFOGLIA | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO | DI <input type="checkbox"/> PIOPPO |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: su un argine di filare di pioppi

NOTE: esemplari crescenti su frustuli di una ceppaia degradata di pioppo

MICROSCOPIA: Spore 8-10 × 4,5-6 µm, ellittiche, bruno-rugginose in massa.

BIBLIOGRAFIA: AMB vol 1a pag. 247, Funghi d'Italia Zanichelli pag.276 al 749.

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CYCLOCYBE AEGERITA



AGROCYBE CYLINDRACEA




CYCLOCYBE AEGERITA



CYCLOCYBE AEGERITA



CYCLOCYBE AEGERITA



SPORE



DESCRIZIONE

Cyclocybe aegerita

Ordine: Agaricales
Famiglia: Bolbitiaceae
Genere: *Cyclocybe*
Specie: *C. aegerita*
Sottogenere: *Aporus*

Sinonimi: *Agrocybe aegerita* (V. Brig.) Singer
Pholiota aegerita (V. Brig.) Quél.
Agaricus aegerita V. Brig.

Cappello: fino a 15 cm di diametro, da emisferico a convesso-piano, color bruno fulvo da giovane per schiarire alla maturazione con tonalità che vanno dal beige al marroncino fino al biancastro, spesso con zona discale più scura. Cuticola lievemente corrugata e spesso fessurata per la siccità, mentre a tempo umido si presenta un po' untuosa.

Lamelle: adnate o appena decorrenti con dentino, alte, fitte e di colore bianco-beige, poi grigio-brunastro ed infine color tabacco per le spore mature. Intervallate da numerose lamellule.

Carne: compatta, bianca o leggermente bruna, odore gradevole di vinaccia, sapore buono e gustoso.

Gambo: 3-15 cm × 0,5-2 cm, cilindrico leggermente affusolato alla base colore bianco poi ocreo, fibroso e consistente, da bianco a brunastro per la sporata, rivestito da minute fibrille longitudinali, con anello carnosio persistente.

Spore: 8-10 × 4,5-6 µm, ellittiche, bruno-rugginose in massa.

Habitat: in gruppi cespitosi, dalla primavera all'autunno inoltrato sui tronchi marcescenti, specialmente di pioppo vecchi (ma anche vivi) di molte altre latifoglie come olmo, sambuco, salice, a tempo mite ed umido.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola