

**SCHEDA N° 0238**

**ORDINE Polyporales**

<b>GENERE</b> <i>Daedalea</i>	<b>SPECIE</b> <i>D. quercina</i>	<b>AUTORE</b> (L.) Pers..	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 25-04-2019	<b>LUOGO DI RACC.</b> Bosco del Fagarè	<b>COMUNE</b> Cornuda	<b>PROV.</b> TV
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 208 Mt	<b>I.G.M.</b> 084 III	<b>RACCOGLITORE</b> Flavio Pinton, Dino G. Cerantola	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI:</b> MISTO DI AGHIFOLGIA E LATIFOLGIA		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO	<b>DI</b> <b>QUERCUS ROBUR</b>

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** latifolia con prevalenza di Populus, Carpinus, Quercus e Castanea.

**NOTE:** un esemplare su una ceppaia morta di Quercus robur.

**MICROSCOPIA:** Spore ialine, lisce, cilindrico-ellissoidali, 5-7.5 x 2.5-3.5 µm. Basidi clavati.

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia Zanichelli a pag. 564 al 1587, Funghi d'Italia A.M.B. vol.2 a pag. 915.

**DETERMINATORE** Cds GMC

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**DAEDALEA QUERCINA**



**DAEDALEA QUERCINA**



**DAEDALEA QUERCINA**



**DAEDALEA QUERCINA**



**DAEDALEA QUERCINA**

## DESCRIZIONE

Daedalea quercina

**Ordine:** Polyporales  
**Famiglia:** Fomitopsidaceae  
**Genere:** Daedalea  
**Specie:** D. quercina  
**Sezione:** -

**Sinonimi:** Agaricus quercinus L.  
Merulius quercinus (L.) Pers.  
Lenzites quercinus (L.) P. Karst.  
Striglia quercina (L.) Kuntze.

**Capello:** 8 - 30 cm, a forma di mensola semicircolare, spesso sovrapposta ad altre, glabro, un po' vellutato ma sempre rugoso, superficie zonata, marcata da zone concentriche alternate, sollevate e depresse, di colore oca-bruno più o meno grigio.

**Imenoforo:** Tubuli lunghi fino a 3 cm, monostratificati, non staccabili, color grigio-crema, I pori sono simili a pseudolamelle, labirintiformi, polignali, sinuoso-allungati, giallo pallido o marrone chiaro.

**Carne:** dura, tenace, legnosa, beige pallido, simile al sughero, con odore gradevole.

**Spore:** ialine, lisce, cilindrico-ellissoidali, 5-7.5 x 2.5-3.5 µm. Basidi clavati.

**Habitat:** fungo parassita. Cresce dalla primavera all' autunno su latifoglie, soprattutto su querce e castagni, raramente su altre essenze, a volte anche su tronchi abbattuti.

Autore della scheda: Pellizzari Renato.

Autore delle foto: Flavio F. Pinton, Dino G. Cerantola.