

SCHEDA N° 0241

ORDINE Polyporales

GENERE <i>Daedaleopsis</i>	SPECIE <i>D. tricolor</i>	AUTORE (Bull.) Bondartsev & Singer	
DATA DI RACCOLTA 09-11-2019	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 5 mt.	I.G.M. 048 I	RACCOGLITORE Cds G.M.C.	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: PLANIZIALE AGHIFOGLIA E LATIFOGLIA		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO	DI <input type="checkbox"/> <i>QUERCUS ILEX</i>

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Pinus, Quercus ilex e Quercus robur.

NOTE: alcuni esemplari su un tronco morto ed abbattuto di Quercus ilex

MICROSCOPIA: Spore ialine, lisce, cilindriche talvolta leggermente ripiegate, 8-10 x 2-2.5 µm. Basidi clavati bi-e tetrasporici.

BIBLIOGRAFIA: Funghi dal vero Bruno Cetto vol.3, pag.515 al 1185, Polyporaceae s.l. Annarosa Bernicchia a pag. 195.

DETERMINATORE Cds G.M.C.

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



DAEDALEOPSIS TRICOLOR



DAEDALEOPSIS TRICOLOR



DAEDALEOPSIS TRICOLOR



DAEDALEOPSIS TRICOLOR



DAEDALEOPSIS TRICOLOR



DAEDALEOPSIS TRICOLOR

DESCRIZIONE

Daedaleopsis tricolor

Ordine: Polyporales
Famiglia: Polyporaceae
Genere: Daedaleopsis
Specie: D. tricolor
Sezione: -

Sinonimi: Agaricus sepiarius var. tricolore (Boll.) Pers.
Daedalea sepiaria subsp. tricolore (Boll.) Pers.
Daedalea tricolore (Bull.) P.
Daedalea sepiaria var. tricolore (Bull.) p.
Lenzites tricolor (Bull.) P.

Capello: basidiomi annuali, semicircolari con dimensioni che variano da pochi cm fino a 15-20 cm di larghezza e con spessore anche di 3 cm nel punto di attacco al substrato, a forma di mensola semicircolare, glabra, solcata e concentricamente zonata, brunastra all'inizio, diventa rosso scuro a maturità, con orlo generalmente più chiaro.

Imenoforo: vicino al punto di attacco al substrato i pori sono angolosi, sinuosi, andando verso il margine i pori si allungano fino a trasformarsi in lamelle che si biforcano tipicamente in altre due lamelle che a loro volta possono ripetere la biforcazione più volte, di color variabile dal grigio-carnicino al bruno-ocra

Carne: dura, coriacea, legnosa, color legno, simile al sughero, con odore nullo.

Spore: ialine, lisce, cilindriche talvolta leggermente ripiegate, 8-10 x 2-2.5 µm. Basidi clavati bi-e tetrasporici con unione a fibbia basale.

Habitat: fungo saprofito. Cresce dalla primavera all' autunno su latifoglie, soprattutto su querce e castagni, raramente su altre essenze, a volte anche su tronchi abbattuti.

Autore della scheda: Pellizzari Renato.

Autore delle foto: Dino G. Cerantola.