

SCHEDA N°

ORDINE Agaricales

GENERE Entoloma	SPECIE E. Fuscotomentosum	AUTORE F.H. Møller	
DATA DI RACCOLTA 24-09-021	LUOGO DI RACC. Pian de Coltura	COMUNE Lentiai	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 740	I.G.M. III 063	RACCOGLITORE Dino G. Cerantola e Flavio Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: MISTO LATIFOGLIE | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Bosco misto di latifoglie

NOTE: su radure e ai margini dei boschi, singoli o in gruppi.

MICROSCOPIA: 8,1-10,4 × 5,8-7,5 µm; non isodiametriche con 7-9 spigoli e profilo variabile, irregolare a volte con rientranze.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag.260 al 696 Champignons de France et d'Europe R. Courtequisse pag.286 n.932 sub

DETERMINATORE Dino G.Cerantola - Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



ENTOLOMA FUSCOTOMENTOSUM



ENTOLOMA FUSCOTOMENTOSUM



ENTOLOMA FUSCOTOMENTOSUM



ENTOLOMA FUSCOTOMENTOSUM



ENTOLOMA FUSCOTOMENTOSUM

DESCRIZIONE

Entoloma fuscotomentosum

Ordine: Agaricales

Famiglia: Entolomataceae

Genere: Entoloma

Specie: E. fuscotomentosum

Sezione: Sottogenere Trichopilus (Romagn.) Noordel. (incl. sottogen. Pouzere//a (Mazzer) Noordel.) - Basidiomi con aspetto tricolomoide-micenoide, pileo ± fibrilloso-squamuloso; cheilocistidi presenti; pileipellis da cutis a tricoaderma.

Sinonimi: Rhodophyllus fuscotomentosus (F.H. Møller) M.M. Moser
Trichopilus fuscotomentosus (F.H. Møller) P.D. Orton,
Entoloma jubatum var. fuscotomentosum (F.H. Møller) E. Ludw.

Capello: 3-6 cm. da conico a campanulato espanso, di solito con umbone ± acuto, molto fibrilloso, colore da grigio a bruno scuro.

Lamelle: poco fitte, sublibere, quasi bianche nei giovani, grigiastre, poi bruno-rossastre negli esemplari maturi.

Carne: biancastra nelle parti centrali, concolore altrove, sapore acidulo.

Gambo: 4-8 x 0.5 -1 cm. cilindrico, interamente percorso lungo il gambo da fibrollosità bruno-rossastre.

Spore: 8,1-10,4 × 5,8-7,5 µm; non isodiametriche con 7-9 spigoli e profilo variabile, irregolare a volte con rientranze, mono o biguttulate, basidi quadrisporici, cheilocistidi di forma variabilissima.

Habitat: Estate - Autunno tra l'erba e radure e ai margini die boschi.

Autore della scheda: Bruno Cerantola

Autore delle foto: Dino G. Cerantola