GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO
ANNO DI FONDAZIONE 1989

COMITATO DI STUDIO " Fernando Fraccaro"
Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV
E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it
Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it

FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

**SCHEDA N°** 0257

**ORDINE** Polyporales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GENERE** Ganoderma | **SPECIE** G. resinaceum | **AUTORE** Boud. | |
| **DATA DI RACCOLTA** 21/07/2018 | **LUOGO DI RACC.** Vallà | **COMUNE** Riese Pio x° | **PROV.** TV |
| **ALTITUDINE S.L.M.** 54 mt. | **I.G.M.** I 104 | **RACCOGLITORE** Dino Giuseppe Cerantola | |

**HABITAT:**

☐ PRATI ERBOSI ☒ ORTI E GIARDINI ☐ MARGINI DI STRADA

☐ TERRENO NUDO ☐ TERRENO SABBIOSO ☐ ARENILE

☐ TORBIERA ☐ TERRENO COLTIVATO A

☐ ARGINE DI FIUME ☐ LUOGO BRUCIATO ☐ BOSCO SUBALPINO

BOSCO DI : MISTO LATIFOGLIA ☐ RADO ☐ FITTO

☐ DENTRO AL BOSCO ☐ AI MARGINI DEL BOSCO ☐ IN RADURE

☒ SU LEGNO ☒ VIVO ☐ MORTO DI ACERO CAMPESTRIS

**ESPOSIZIONE:** ☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO** ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :** misto latifoglia

**NOTE :** Parassito-saprofita in varie fasi di crescita biennale su un tronco di Acero campestris

**MICROSCOPIA:** spore 10-12 x 5-7,5 µm, brune, largamente ellissoidali, verrucose, Sistema ifale trimitico .

**BIBLIOGRAFIA :** Funghi dal vero "Bruno Cetto" vol.3 al 1179. Funghi Europei Polyporaceae A. Bernicchia pag. 238

**DETERMINATORE** C.d.s. G.M.C.

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI** ☒ FRESCHI ☐ SECCHI

**GANODERMA RESINACEUM - PRIMORDIO**

**GANODERMA RESINACEUM**

**GANODERMA RESINACEUM**

**GANODERMA RESINACEUM**

**GANODERMA RESINACEUM**

GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO
ANNO DI FONDAZIONE 1989

COMITATO DI STUDIO " Fernando Fraccaro"
Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV
E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it
Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it

FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI

**DESCRIZIONE**

Ganoderma resinaceum

**Ordine:** Polyporales
**Famiglia:** Polyporaceae
**Genere:** Ganoderma
**Specie:** G. resinaceum
**Sezione:**

**Sinonimi:** Fomes resinaceus (Boud.) Sacc.
Scindalma resinaceum (Boud.) Kuntze
Friesia resinacea (Boud.) Lázaro Ibiza
Ganoderma lucidum subsp. resinaceum (Boud.) Bourdot & Galzin

**Cappello:** a forma di mensola, 10-40 cm. annuale o pluriennale, generalmente sessile, crescita singola o sovrapposta. inizialmente formato da primordi ovoidali di colore bianco, la cui superficie tende ad ingiallire ed a formare una crosta prima ocra, lucida, laccata, infine bruno rossastro, meno lucida. Successivamente il carpoforo si allarga e tende ad assottigliarsi con una forma incompleta o reniforme con superfice laccata e solcata, bordo da ottuso a sottile, prima biancastro poi concolore, poco più chiaro.

**Imenoforo:** Tubuli stratificati in 2-5 strati, bruni; pori piccoli e rotondi, bianchi, in vecchiaia ocra brunastri.

**Carne:** inizialmente di consistenza dura e legnosa, poi sugherosa, di colore marrone chiaro, bruno rossiccio. Gli esemplari in vecchiaia sono molto leggeri. Odore speziato, sapore acidulo.

**Gambo:** rudimentale od assente, spesso deforme.

**Spore:** 10-12 x 5-7,5 µm , brune, largamente ellissoidali, verrucose, apice tronco.

**Habitat:** Presente su tutta la penisola; fungo parassita, agente di carie alla base del fusto o su ceppaie di latifoglia, predilige Querce decidue, leccio, pioppo, platano, acero.

Autore della scheda: C.d.s. G.M.C.

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola