

SCHEDA N° 0076

ORDINE Pezizales

GENERE <i>Geopora</i>	SPECIE <i>G. sumneriana</i>	AUTORE (Cooke) Masee M. Torre	
DATA DI RACCOLTA 01-04-2013	LUOGO DI RACC. Parco cittadino	COMUNE Castelfranco V.to	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 43	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Pinton Franco Flavio	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: CEDRUS | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Cedrus e latifoglie varie

NOTE: in gruppi di numerosi esemplari semipogeo e-o affiorante tra l'erba sul prato, di varie specie di Cedri molto vecchi

MICROSCOPIA: 30-33 X 12-14 µm.

BIBLIOGRAFIA: Breitenbach Vol.1 pag.88 al 68, AMB Vol.2 pag.980 Ascomiceti d'Italia a pag. 64 G. Medardi

DETERMINATORE CDS GMC

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCI



GEOPORA SUMNERIANA



GEOPORA SUMNERIANA 1



GEOPORA SUMNERIANA 2



ASCHI CON SPORE



ASCHI E PARAFISI



G. SUMNERIANA

DESCRIZIONE

Ordine: Pezizales
Famiglia: Pyronemataceae
Genere: Geopora
Specie: Sumneriana

Ascoma sotto forma di apotecio: fino a 7 cm. e oltre di diametro, inizialmente seminterrato e chiuso quasi a sfera forata al centro nella parte superiore, a forma di coppa frastagliata da adulto, spessore grosso, all'interno liscio, bianco o crema, all'esterno bruno chiaro, ricoperto su tutta la superficie da folta peluria brunastra, incrostata da granuli colorati, sempre invasa da minutissimi residui sabbiosi del terreno.

Gambo: assente.

Carne: dura, consistente, cassante, ceracea biancastro-gialla, inodore ed insapore.

Spore: ellissoidali, lisce, biguttulate o pluriguttulate, 30-33 x 12-14 μm . uniseriate nell'asco.

Aschi : 360 x 18-19 μm , cilindrici, non amiloidi, ottasporici. parafisi cilindracee, leggermente clavate in alto. settate. 600-700 μm .

Habitat: in primavera, semipogeo, in gruppi di numerosi esemplari, simbionte sotto Cedrus.

Autore della scheda: CDS GMC

Autore delle foto: Pinton Franco Flavio