

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SCHEDA N° 0269		ORDINE Boletale	S
GENERE Gomphidius	SPECIE G. maculatus	AUTORE (Scop.) Fr.	
DATA DI RACCOLTA 24/09/2021	LUOGO DI RACC. Pian de Coltura	COMUNE Lentiai	Prov. BL
ALTITUDINE S.L.M. 745	I.G.M. III 063	RACCOGLITORE Dino Cerant	tola - Flavio Pinton
HABITAT:			
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA	1
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	Bosco subalpino □	
BOSCO DI: AGHI-LATIFOGLIA		RADO	☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI	
ESPOSIZIONE:	ASSOLATA 0	OMBROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO U	UMIDO UMIDO ASCIUTTO	SECCO
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: in prossimità di Larix			
Note: Alcuni esemplari viciniori di diverse dimensioni, su prato erboso in prossimità di larici			
MICROSCOPIA: spore elissoidali - fusiformi dim. 18-23 x 6-9 μm - colore olivastro scuro			
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia - A.M.B. pag. 875 - Funghi d'Italia Zanichelli pag. 516 al n° 1442			
DETERMINATORE Cds G.M.C.	RILIEVI EF	FFETTUATI SU REPERTI 🛛 FRESCHI	☐ SECCHI
GOMPHIDIUS MACULATUS	GOMPHIDIUS MAC	ULATUS GOMPH	Dino G Geranda HIDIUS MACULATUS
GOMPHIDIUS MACULATUS	GOMPHIDIUS MAC	o Dino G. Cerantola ULATUS	



COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



DESCRIZIONE

Gomphidius maculatus

Ordine: Boletales
Famiglia: Gomphidiaceae
Genere: Gomphidius
Specie: G. maculatus

Sezione:

Sinonimi: Agaricus maculatus Scop., Fl. carniol., Edn 2 (Wien) 2: 448 (1772)

Gomphidius gracilis Berk., Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 2 13: 402 (1854) Gomphidius furcatus Peck, Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 52: 649 (1899)

Cappello: 3-6 cm; da convesso a piano con leggero umbone al centro; superficie glutinosa, cremabiancastro, poi ocra- incarnato, si macchia a zone ± estese rossastre, poi brunastre, infine nere.

Lamelle: molto rade, arcuato-decorrenti, alcune biforcute, bianche, rossastre alla pressione, poi quasi nere a maturità.

Carne: bianca, rossastra al taglio, giallastra nello stipite; senza odore e sapore significativi.

Gambo: 3-7 x 0,5-1,5 cm; subcilindrico, talvolta un po' fusiforme, dapprima bianco con essudazioni acquose rossastre, poi nerastre, interamente macchiato di nero a completa maturazione.

Spore: elissoidali - fusiformi dim. 18-23 x 6-9 μm - colore olivastro scuro.

Habitat: estate-autunno; in zone erbose presso larici, poco frequente.

Autore della scheda: Cds del G.M.C.

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola