

SCHEDA N° 0214

ORDINE Boletales

GENERE Gyrodon	SPECIE G. lividus	AUTORE (Bull. : Fr.) P. Karsten	
DATA DI RACCOLTA 26/09-05/10	LUOGO DI RACC. P. Sile	COMUNE Vedelago	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| <input checked="" type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> RADO |

BOSCO DI : PIANURA MISTO A LATIFOGLIE

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Latifoglie varie Aceri- Querce -Salici- Pioppi

NOTE : Stazione di crescita di molti esemplari gregari in file e a semicerchio in luogo molto umido, sotto siepe di Ontano nero

MICROSCOPIA: Spore piccole ovoidali 4-6 x 3,5-5 µ Sporata bruno-oliva

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia Zanichelli pag. 476 al n°1342 - Funghi d'Italia A.M.B. vol 2 pag. 885

DETERMINATORE Franco Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



GYRODON LIVIDUS



GYRODON LIVIDUS



GYRODON LIVIDUS



GYRODON LIVIDUS



GYRODON LIVIDUS

DESCRIZIONE

Gyrodon lividus

Ordine: Boletales

Famiglia: Paxillaceae

Genere: Gyrodon

Specie: lividus

Sezione: Genere > Gyrodon Opat.---Basidiomi poco carnosì, pileo vischioso, tubuli aderenti e decorrenti, carne virante al blu, gambo +/- eccentrico e ricurvo, specie simbiote dell'Ontano.

Sinonimi: Boletus lividus Bull., Herb. Fr. Champ., Hist. Champ. Fr. (Paris) 1: 327 (1791)

Boletus brachyporus Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 128 (1825)

Boletus chrysenteron var. lividus (Bull.) Mérat, Nouv. Fl. Environs Paris 1: 45 (1821)

Capello: 4-12 cm; da convesso a appianato-depresso, irregolare, margine ondulato; superficie vischiosa, di colore bruno-pallido, crema-giallognolo, caffelatte, ± macchiato di bruno-ruggine.

Tubuli: molto corti e decorrenti sullo stipite, giallognoli, poi verdastri, imbrunenti alla pressione; pori labirintiformi, grandi, dentellati, concolori ai tubuli, blu-verdastro, poi brunastri al tocco.

Carne: giallastra, fibrosa, appena azzurrognola al taglio; senza odore e sapore particolari.

Gambo: 6-9-12 x 1-2cm; per lo più eccentrico e ricurvo, da giallastro a bruno-vinoso, fibrilloso, annerente con l'età e la manipolazione.

Spore: generalmente piccole, ovoidali 5-7 x 3,5-4,5 µ Sporata bruno-oliva

Habitat: in zone umide, con terreno aquitrinoso, associato e simbiote esclusivamente sotto ontani. a tutte le quote, dall'estate all'autunno Non comune. Comm.

Autore della scheda: Franco Flavio Pinton

Autori delle foto: Franco Flavio Pinton Dino G.Cerantola