

SCHEDA N° 0317

ORDINE Agaricales

GENERE Hebeloma	SPECIE H. leucosarx	AUTORE P.D. Horton	
DATA DI RACCOLTA 22/11/2021	LUOGO DI RACC. Cà Marcello Levada	COMUNE Piombino Dese	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. IV 127	RACCOGLITORE Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : BOSCHETTO PLANIZIALE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Latifoglie con prevalenza Carpinus

NOTE : Stazione di crescita gregaria con esemplari di varia grandezza su terreno molto umido sotto Carpini

MICROSCOPIA: 10-13 x 6-7 um, citrino-amigdaliformi, sottilmente verrucose

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia Zanichelli pag. 356 al 982 funghi d'Italia A.M.B.vol. 3 pag.1167

DETERMINATORE Flavio Pinton - Dino Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



HEBELOMA LEUCOSARX



HEBELOMA LEUCOSARX



HEBELOMA LEUCOSARX LABELLE



H. LEUCOSARX IMENIO E CORTINA

DESCRIZIONE

Hebeloma leucosarx

Ordine: Agaricales
Famiglia: Cortinariaceae
Genere: Hebeloma
Specie: H. leucosarx
Sezione: denudata (Fr.) Sacc.

Sinonimi: Hebeloma velutipes Bruchet, Bull.
Hebelomatis leucosarx (P.D. Orton) Locq.,
Hebelomatis velutipes (Bruchet) Locq.,

Cappello: da 7 cm; da convesso-campanulato a convesso espanso, ± umbonato, margine involuto, poi steso e di solito ± ondulato lobato; superficie vischiosa a tempo piovoso, glabra, crema-biancastro, ± intensamente oca-fulvastro al centro.

Lamelle: fitte, smarginate, pallide, poi bruno-argilla, spesso punteggiate di bruno a maturità.

Carne: bianca; con odore rafanoide e sapore amarognolo.

Gambo: 4-8 x 0,5-1 cm; cilindrico, talvolta con base sub-bulbosa, da pruinoso a finemente fioccoso, bianco, imbrunisce al tocco e con l'età.

Spore: 10-13 x 6-7 um, citrino-amigdaliformi, sottilmente verrucose.

Habitat: a fine estate-autunno; sotto latifoglie in zone umide. Non comune.

Autore della scheda: Flavio Franco Pinton

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola