

SCHEDA N° 0283

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Hebeloma</i>	SPECIE <i>H. sacchariolenis</i>	AUTORE Quél.	
DATA DI RACCOLTA 05/11/2021	LUOGO DI RACC. Vallà	COMUNE Riese piox	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 54	I.G.M. I 104	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

<input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: LATIFOGIE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Latifolia varie e filari di Quercus

NOTE: numerosi esemplari singoli, e gregari in mezzo all'erba, in prossimità di un filare di Quercus su terreno molto umido

MICROSCOPIA: spore 11,60 - 15 x 6.5 - 8 micron. finemente verrucose

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag. 358 al 987. Funghi in Italia Nicolò Oppicelli pag. 412. Cetto vol. 3 pag.129 al 929

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



HEBELOMA SACCHARIOLENS



HEBELOMA SACCHARIOLENS



HEBELOMA SACCHERIOLES



HEBELOMA SACCHARIOLENS

DESCRIZIONE

Hebeloma sacchariolens

Ordine: Agaricales

Famiglia: Cortinariaceae

Genere: **Hebeloma**

Specie: H.Sacchariolens

Sezione: Denudata (FR.) Sacc. >- (incl. Sez. Porphyrosporo) - Basidiomi con veli effimeri anche in gioventù; subito con stipite senza tracce di velo o di cortina; lamelle gementi o meno guttule acquose, ± punteggiate di bruno con l'età.

Sinonimi: Hebeloma latifolium Gröger & Zschiesch., Z. Mykol. 47(2): 198 (1981)
Hebeloma sacchariolens var. pallidoluctuosum (Gröger & Zschiesch.) Quadr., Mycotaxon 30: 309 (1987)

Capello: 2 - 5 cm. da prima emisferico, a convesso, infine spianato, e con largo e basso umbone ottuso al centro, margine talvolta ondulato, superficie liscia un pò vischiosa a tempo umido, di colore chiaro, ocraceo-crema, al centro.

Lamelle: da adnate al gambo, larghe e ventricose in esemplari adulti, intervalate da lamellule, di colore beige ad ocraceo-rosato poi brunastre, filo lamellule più chiaro.

Carne: compatta, poi fibrosa biancastra nel pileo, brunastro nel stipite, con odore gradevole, simile allo zucchero bruciato, sapore amarognolo.

Gambo: 2-7 x 0.4-1 cm. cilindrico, appena allargato alla base, biancastrato, siriceo-fibriloso, ricoperto da pruina bianca all'apice glabro e brunastro al toco e con l'età.

Spore: 11,60 - 15 x 6.5 - 8 micron. amigdaliformi viste di faccia, mediamente verrucose.

Habitat: Estate - Autunno sotto varie latifoglie anche nei parchi cittadini in zone fresche e umide.

Autore della scheda: Bruno Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola