

SCHEDA N° 0129

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Hygrocybe</i>	SPECIE <i>H. nigrescens</i>	AUTORE (Qué.) Kühner	
DATA DI RACCOLTA 12-06-2013	LUOGO DI RACC. parco cittadino	COMUNE Castelfranco Veneto	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 43	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Dino G. Cerantola	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: MISTO DI AGHI-LATIFOGIE | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Cedrus

NOTE: stazione di crescita di pochi esemplari su lettiera di aghi di Cedrus in parco cittadino

MICROSCOPIA: spore bianche in massa, lisce, ellittiche, cilindraceo-ilissoidali di 9-12 x 6-8 µm. basidi bisporici o tetrasporici

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag 106 al 233. Funghi d'Italia A.M.B. a pag.10

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



HYGROCYBE NIGRESCENS



HYGROCYBE NIGRESCENS1




HYGROCYBE NIGRESCENS3



BASIDI E BASIDIOLI



CHEILOCISTITIDI E SPORE



IFE E TRAMA IMENIALE

DESCRIZIONE

Hygrocybe nigrescens

Ordine: Agaricales
Famiglia: Hygrophoraceae
Genere: *Hygrocybe*
Specie: *Nigrescens*

Cappello: diametro 2-5 cm, conico, campanulato, con umbone appuntito e marcato, anche con il cappello disteso, margine lobato, cuticola opaca, fibrillosa, colore rosso aranciato, rosso scarlatto o giallo aranciato infine verdastro, che annerisce al tocco e in vecchiaia, oppure se viene raccolto, dopo alcune ore.

Lamelle: spesse, spaziate, inizialmente un poco saldate al gambo, poi libere; di colore giallo, anche pallide, in seguito annerenti.

Carne: scarsa, succoso-acquosa, giallastra nel cappello; nel gambo, esternamente, è concolore e, all'interno, è grigiastro. Odore debole o assente, insapore.

Gambo: 5,0-8,0 centimetri di altezza per 0,4-1,2 cm di diametro; cilindrico, slanciato; di colore da giallo o concolore al cappello, biancastro alla base, da farcito a cavo, fibrillato-rigato, fortemente annerente.

Spore: bianche in massa, lisce, ellittiche, di dimensioni di 9-12 x 6-8 µm, basidi bisporici o tetrasporici, clavati, con giunti a fibbia.

Habitat: nelle radure dei boschi, nei prati, anche in parchi e giardini, in zone umide, frequente nei periodi di pioggia. Estate - autunno.

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Dino G. Cerantola