

SCHEDA N° 0254

ORDINE Agaricales

GENERE Hygrophorus	SPECIE <i>H. agathosmus</i> var. <i>hyacinthinus</i>	AUTORE (Quél.) Krieglst.	
DATA DI RACCOLTA 10-10- 2019	LUOGO DI RACC. Gosaldo x mostra mic.	COMUNE Gosaldo	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1200	I.G.M. II 045	RACCOGLITORE soci c.d.s. G.M.C.	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: MISTO AGHI-LATIFOGLE | | <input type="checkbox"/> RADO <input checked="" type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Abeto rosso- misto Faggio

NOTE: stazione di crescita di pochi esemplari, gregario, nell'erba sotto *Picea abies*

MICROSCOPIA: spore ellissoidali lisce da 9-10,5 x 5-6 um. basidi tetrasporici

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag.120 al n° 272 Funghi d'Italia A.M.B.vol. 2 pag. 551

DETERMINATORE c.d.s.G.M.C.

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



HYGROPHORUS HYACINTHINUS



HYGROPHORUS HYACINTHINUS



HYGROPHORUS HYACINTHINUS



HYGROPHORUS HYACINTHINUS

DESCRIZIONE

Hygrophorus hyacinthinus

Ordine: Agaricales

Famiglia: Agaricaceae

Genere: *Hygrophorus*

Specie: *H. hyacinthinus*

Sottosezione: Tephroleuci - Bataille stipite asciutto, pruinoso, velo assente

Sinonimi: *Agaricus agathosmus* Fr., *Observ. mycol. (Havniae)* 1: 16 (1815)
Agaricus cerasinus Berk., in Smith, *Engl. Fl., Fungi (Edn 2) (London)* 5(2): 12 (1836)

Capello: da 5-8 cm; da emisferico a piano-convesso, presto appianato con margine involuto; superficie liscia, sericeo-fibrillosa, viscida solo a tempo umido, bianco-grigiastra, talora più scura al centro.

Lamelle: ± decorrenti, poco arcuate, spaziate, bianche.

Carne: bianca, con tipico odore di giacinto, di vernice secondo la nostra esperienza, sapore dolciastro.

Gambo: da 5-10 x 0,5-1 cm; cilindrico, rastremato alla base, fibrilloso, ± concolore al pileo.

Spore: elissoidali lisce da 9-10,5 x 5-6 um.

Habitat: estate-autunno; boschi montani di aghifoglie, in particolare abete rosso. Non comune.

Autore della scheda: C.d.s .G.M.C.

Autore delle foto: Dino G. Cerantola