

SCHEDA N° 0107

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Hypholoma</i>	SPECIE <i>H. fasciculare</i>	AUTORE (Huds.) P. Kumm.
DATA DI RACCOLTA 27/03/014	LUOGO DI RACC. parco cittadino	COMUNE Castelfranco Veneto
ALTITUDINE S.L.M. 43	I.G.M. II 104	PROV. TV
RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton		

HABITAT:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ PRATI ERBOSI | ☒ ORTI E GIARDINI | ☐ MARGINI DI STRADA |
| ☐ TERRENO NUDO | ☐ TERRENO SABBIOSO | ☐ ARENILE |
| ☐ TORBIERA | ☐ TERRENO COLTIVATO A | ☐ BOSCO SUBALPINO |
| ☐ ARGINE DI FIUME | ☐ LUOGO BRUCIATO | ☐ RADO |
- ☐ BOSCO DI : **BOSCHETTO DI LATIFOGIE MISTE** ☐ FITTO

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ DENTRO AL BOSCO | ☒ AI MARGINI DEL BOSCO | ☐ IN RADURE |
| ☒ SU LEGNO | ☐ VIVO | ☒ MORTO |
- ☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA
- ☐ PICCOLO CEPPINO TAGLIATO DI OLMO

ESPOSIZIONE:

UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : carpini, celtis, prunus, cespugli di rovi

NOTE : famigliola poco cespitosa tra le foglie, ma ben radicato su ceppo marcescente e nascosto; di Olmo interrato

MICROSCOPIA: spore elissoide-amigdaliformi, lisce da 6-7,5 x 4-5 µ cistidi di forma variabile da ventricosetti a cilindrici

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia A.M.B vol. 1 pag. 245 Funghi d'Italia Zanichelli pag. 280 al n°752

DETERMINATORE c.d.s. G.M.C

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




HYPHOLOMA FASCICULARE




HYPHOLOMA FASCICULARE




HYPHOLOMA FASCICULARE



SPORE



SPORE



CISTIDI VENTRICOSO-CILINDRIFORMI

DESCRIZIONE

Hypholoma fasciculare

Ordine: Agaricales
Famiglia: Strophariaceae
Genere: Hypholoma
Specie: fasciculare
Sezione: Fascicularia (F.R.)

Cappello: da 3-6 cm inizialmente emisferico a convesso pianeggiante, liscio margine a volte con residui cortinoidi; giallo-solforino con al centro tonalità rossastro-fulvo.

Lamelle: fitte, a lungo gialle. poi olivastre infine bruno-porpora.

Carne: sottile, giallastra; inodore e decisamente di sapore amaro.

Gambo: 5-10 x 0,5-1 cm cilindrico di solito ricurvo verso al basso, con colore al cappello +/- fibrilloso e imbrunente alla manipolazione, zona anulare con resti di cortina assai scarsi.

Spore: elissoide-amigdaliformi, lisce da 6 -7,5 x 4-5µ cistidi di forma variabile da ventricosetti a cilindrici, con varie strozzature.

Habitat: in numerosi esemplari concrescenti cespitosi, fascicolati, su legno marcescente di latifoglie e di conifere; assai comune dalla primavera-estate a tutto l'autunno.

Autore della scheda: c.d.s. G.M.C

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton