

**SCHEDA N° 0253**

**ORDINE Boletales**

<b>GENERE</b> <i>Imperator</i>	<b>SPECIE</b> <i>I. luteocupreus</i>	<b>AUTORE</b> (Bertéa & Estadès)	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 22/09/2020	<b>LUOGO DI RACC.</b> Parco del Sile	<b>COMUNE</b> Vedelago	<b>PROV.</b> TV
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 31 mt.	<b>I.G.M.</b> IV 030	<b>RACCOGLITORE</b> Dino G. Cerantola - Flavio Pinton	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI:</b> MISTO LATIFOGLIE PLANIZIALE		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** sotto Quercia e sottobosco di cespugli di latifoglia mista

**NOTE:** Spece gregaria, con diversi esemplari maturi in tre periodi di crescita

**MICROSCOPIA:** spore 11-13 x 4,5-6 µm, bruno olivastro in massa, lisce, ellissoidali, subfusiformi, guttulate.

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia Zanichelli pag. 490 al 1376, Funghi d'Italia AMB vol. 3 a pag. 1381.

**DETERMINATORE** C.d.s. G.M.C.

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**IMPERATOR LUTEOCUPREUS**



**IMPERATOR LUTEOCUPREUS**



**IMPERATOR LUTEOCUPREUS**



**IMPERATOR LUTEOCUPREUS**

## DESCRIZIONE

### **Imperator luteocupreus**

**Ordine:** Boletales

**Famiglia:** Boletaceae

**Genere:** Imperator

**Specie:** luteocupreus

**Sezione :** Luridi FR. basidiomi che si macchiano piu o meno intensamente di blu al minimo tocco, carne giallastra, piu o meno bluastra alla sezione; pori rossi, rosso-arancioni, inizialmente anche gialli, stipite con o senza reticolo

**Sinonimi:** Boletus luteocupreus (Bertéa & Estadès)

**Capello:** 8-20 cm, molto carnoso, emisferico, che si trasforma in una forma convessa, senza appiattirsi completamente.

Orlo notevolmente eccessivo e involuto che forma una caratteristica ondulazione nei vecchi esemplari.

Cuticola con colorazioni iniziali giallo-cromo, successivamente assume toni rosso-ruggine o rosso-rame non uniforme, si macchia di verde bluastrò-blu nerastro al minimo contatto.

**Tubuli:** lunghi, giallo vivo, poi bruno-olivastri; pori molto piccoli, gialli nei giovani esemplari, poi presto rosso sangue su tutta la superficie, talvolta dai toni arancioni verso il bordo, virano al blu scuro al taglio o al tocco.

**Carne:** soda, di colore giallo-oro, rossastra all'estrema base del gambo, al taglio inizialmente vira immediatamente al blu scuro su tutta la sezione, per poi assumere toni rossastri.  
Odore dedole, sapore acidulo.

**Gambo:** 5-10 x 3-5 cm; da cilindrico a claviforme, robusto, giallo-cromo, rossastro alla base, ricoperto da un reticolo a maglie lunghe, color rosso sangue; virante al minimo tocco.

**Spore:** 11-13 x 4,5-6 µm, bruno olivastro in massa, lisce, ellissoidali, subfusiforme, guttulate.

**Habitat:** spece termofila, cresce in boschi di latifoglie, in particolare querce e castagni, in estate/autunno, specialmente dopo forti e abbondanti piogge, ma quando il terreno è ormai asciutto.

Autore della scheda: C.d.s. G.M.C.

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola