

SCHEDA N° 0246

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Inocybe</i>	SPECIE <i>I. haemacta</i>	AUTORE (Berk. & Cooke) Sacc.	
DATA DI RACCOLTA 19/11/2019	LUOGO DI RACC. Vallà	COMUNE Riese Po X	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 55 mt.	I.G.M. I 104	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☒ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Carpinus e Fagus.

NOTE : gruppetti di 5-6 esemplari sotto una siepe di Carpino e Faggio di un giardino domestico.

MICROSCOPIA: Spore 9-10,5 x 5,5- 6,5 µm, lisce, ellissoidali, quasi a forma di mandorla con una lieve papilla.

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia Zanichelli a pag. 366 al 1012; Champignon de Suisse (Breitenbach) vol.5 pag.58 al 27.

DETERMINATORE Cds G.M.C.

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



INOCYBE HAEMACTA



INOCYBE HAEMACTA



INOCYBE HAEMACTA



INOCYBE HAEMACTA



INOCYBE HAEMACTA

DESCRIZIONE

Inocybe haemacta

Ordine: Agaricales
Famiglia: Cortinariaceae
Genere: Inocybe
Specie: haemacta
Sezione: Lactiferae

Sinonimi: Agaricus haemactus Berk. & Cooke
Inocybe corydalina f. haemacta (Berk. & Cooke)
Inocybe haemacta var. rubra Rea

Cappello: 20-50 (70) mm di diametro, inizialmente conico ottuso con un margine involuto, che presto si espande da convesso a largamente piano, provvisto di largo umbone ottuso.
Cuticola ricoperta da fibrille dissociate in squame concentriche sollevate di colore ocre, ocre brunastro che appaiono grigio-verdi verso il centro, qua e là sfumate di toni rossastri con l'età.

Lamelle: mediamente fitte, sottili, larghe, adnate, inizialmente di color ocre chiaro, tendenti ad imbrunire a maturità, con filo irregolare e più chiaro, tendono ad arrossare al tocco e con l'età, presenza di lamellule.

Carne: bianca sia nel pileo che nello stipite, verdastra alla base dello stipite, con tendenza ad arrossare dove lesionata, annerente in vecchiaia; odore sgradevole, penetrante ± terroso o di urina e letame di cavallo.

Gambo: 30-50 x 5-8 mm, cilindrico, pieno, leggermente bulboso, a volte ricurvo e fibrilloso in basso; pruinoso e biancastro nella zona superiore, base a tonalità rossastre con lievi sfumature grigio-verdastre, blu-nerastro alla manipolazione.

Spore: 9-10,5 x 5,5- 6,5 µm, lisce, elissoidali, quasi a forma di mandorla con una lieve papilla.
Basidi strettamente clavati, tetrasporici.

Habitat: fungo poco comune, cresce in estate-autunno, in terreni argillosi ed arricchiti con detriti e sotto boschi di latifoglie, in particolare sotto querce (Quercus) e faggi (Fagus).

Autore della scheda: Cds G.M.C.

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola